003/2020/01

Aetheroleum pro inhalatione

(Aetherol. pro inhal.)

Expectorans. Phytotherapeuticum.

ATC besorolás: a köhögés és meghűlés gyógyszerei – Eucalypti aetheroleum HR05WA5008 – Pini silvestris aetheroleum HR05WA5040.

Javallat

A tracheobronchialis rendszer váladékképződéssel járó gyulladásos folyamatai.

Rp.

Eucalypti aetherolei

Pini silvestris aetherolei

aa grammata tria (aa g 3,0)

M. f. solutio.

D.S.: 10 cseppet 1 liter forró vízbe, belélegzésre.

Fontos tudnivalók

A vízgőzzel telített levegő belélegzése oldja a nyálkahártyára tapadt váladékot, az illóolajelegy emellett enyhe izgató hatása révén elősegíti annak felköhögését. Az inhalálás módja: felnőtteknek és 12 év feletti gyermekeknek és serdülőknek 10 csepp, 4-12 éves kor közötti gyermekeknek 6 csepp illóolajelegyet 1 liter nyitott edényben levő forró vízbe vagy kamillateába cseppentünk. A beteg e fölé hajolva vagy fordított tölcséren át, nyitott szájjal a gőzt belélegzi. A belégzés 10-15 percig tart, ezt naponta 2-3-szor megismételjük. Gyermekeknek csak orvosi javaslatra, fokozott óvatossággal adható. Szükség esetén - felnőtt részére - 0,10 g mentollal is rendelhető.

Hatóanyagok

Eucalypti aetheroleum: *antiszeptikus és expectorans hatású.*

Pini silvestris aetheroleum: *enyhén izgatja a légutak nyálkahártyáját, nyákoldó hatású.*

Ellenjavallat

A hatóanyagokkal szembeni túlérzékenység, tüdőasthma, szamárköhögés, fulladásos köhögés. 4 éves kor alatt nem használható. Terhesség, szoptatás időszakában adatok hiányában alkalmazása nem javasolt.

Figyelmeztetés

Csak az előírt hígításban használható, mivel nagyobb koncentrációban gátolhatja a csillószövetek mozgását. A hypoglycaemiás terápiával interferálhat. Ha 1 hét alkalmazás után a tünetek nem múlnak, orvosi konzultáció ajánlott.

Mellékhatás

Nyálkahártya irritáció, nagyobb koncentrációban a hámsejtek, a tüdőszövet károsodása, allergia, hörgőgörcs, vagy a már fennálló spasmus fokozódása.