008/2020/01

Calendulae flos
(Calend. fl.)

Calendulae flos **50,0 g**

Expedíció

Cerátzacskóban, kartondobozban, adagolókanállal.

Szignatúra

Körömvirág.

Dermatologicum. Antiphlogisticum. Phytotherapeuticum.

ATC besorolás: egyéb növényi szerek sebek és fekélyek kezelésére HD03WX. Egyéb emolliensek és protectivumok HD02WX.

Fontos tudnivalók

1,0-2,0 g (kb. 15-30 ml) aprított körömvirágot 150 ml forró vízzel leöntünk, gyakori kevergetés közben 15 percig állni hagyjuk. Leszűrés után – a még enyhén meleg szüredéket – borogató kötések impregnálására, sebek lemosására, szájöblítésre vagy gargalizálásra az alábbiak szerint használjuk. Enyhe bőrgyulladások (pl. napégés) tüneti kezelése: lemosással vagy borogatással. A borogatást 30-60 percig a bőrön kell tartani. Kisebb kiterjedésű, felületi sebek kiegészítő kezelése: lemosással. Szájüregi és torokgyulladás tüneti kezelése: öblítéssel, gargalizálással. A kezeléseket naponta 2-4 ízben végezzük. Gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Hatóanyagok

Calendulae flos: *antibakteriális és antiphlogistikus hatás.*

Javallat

Enyhe dermatitis (pl. napégés) tüneti kezelése, kisebb kiterjedésű, felületi sebek kiegészítő kezelése, valamint szájüregi gyulladás és pharyngitis tüneti kezelése.

Ellenjavallat

Körömvirággal, általában az Asteraceae (Compositae) növénycsalád tagjaival szembeni ismert túlérzékenység.

Figyelmeztetés

Adatok hiányában terhes és szoptató nőknek, valamint bőrgyulladás tüneti kezelésére, sebek kiegészítő kezelésére 6 év alatti, szájüregi és torokgyulladás kezelésére, öblítésre, gargalizálásra 12 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. A beteg figyelmét fel kell hívni, hogy amennyiben a tünetek 1 hét alatt nem enyhülnek, vagy a kezelés ideje alatt súlyosbodnak, illetve bőrfertőzés tünetei mutatkoznak, orvoshoz kell fordulni.

Mellékhatás

Allergiás bőrreakciók, nem ismert gyakorisággal.