025/2020/01

Cremor lini
(Crem. lin.)

Dermatologicum.

ATC besorolás: bőrlágyító- és védőanyagok D02A.

Javallat

Száraz bőr.

Rp.

Lini olei virginalis

grammata novem (g 9,0)

Polysorbati 60

grammata duo (g 2,0)

Propylenglycoli

grammata quattuor (g 4,0)

Alcoholis cetylici et stearylici

grammata octo et centigrammata septuaginta (g 8,70)

Cerae albae

grammata sex et centigrammata sexaginta (g 6,60)

Glyceroli 85%

grammata undecim (g 11,0)

Solutionis conservantis FoNo VIII.

gramma unum (g 1,0)

Aquae purificatae

ad grammata centum (ad g 100,0)

M. f. cremor.

D.S.: Külsőleg. Bőrpuhító krém. Hűtőszekrényben tartandó!

Felhasználhatósági időtartam 3 hónap.

Fontos tudnivalók

Külsőleg. Szokásos alkalmazása: a száraz bőrfelületet naponta egyszer vagy többször bekenjük. Parabénre érzékeny egyének esetén a készítmény Solutio conservans nélkül, kálium-szorbát felhasználásával is elkészíthető, Cremor lini sine parabeno néven. Ebben az esetben a készítmény 0,27 g kálium-szorbátot (Kalii sorbatis centigrammata viginti septem (g 0,27) tartalmaz. A készítmény legfeljebb 3000 NE A-vitamin (Vitamini A Unitates Internationales tria milia (IU 3000), és 15 mg E-vitamin (Int-rac-α-Tocopherylis acetatis milligrammata quindecim (mg 15,0) hozzáadásával is készíthető. A szignatúrán az A- és E-vitamin mennyiségnek is meg kell jelennie.

Hatóanyagok

Glycerolum 85 per centum: *higroszkópos tulajdonságú. Elősegíti a bőr víztartalmának megőrzését.*

Lini oleum virginale: *omega-3-zsírsavakat tartalmazó zsíros olaj, bőrlágyító, elősegíti a bőr víztartalmának megőrzését.*

Vitaminum A syntheticum densatum oleosum (a vitaminozott készítmény esetén)**:** *hámosító, befolyásolja a faggyúmirigyek működését, a pórusok összehúzásával elősegíti a bőr nedvességtartalmának megőrzését.*

Int-rac-α-Tocopherylis acetas (a vitaminozott készítmény esetén)**:** *gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató, antioxidáns hatásával védi a bőrt.*

Ellenjavallat

A készítmény összetevőivel szembeni ismert túlérzékenység.

Figyelmeztetés

A-vitamin hozzáadása esetén a következőket is figyelembe kell venni. Terhesség alatt a megfelelő mennyiségű A-vitamin fogyasztása legjobban egészséges, változatos étrenddel biztosítható. Rutinszerű A-vitamin pótlás terhesség (várható terhesség) esetén nem javasolt. Amennyiben alkalmazása orvosi szempontból mégis feltétlenül indokolt, a mesterséges bevitelre javasolt napi A-vitamin adag 2500 NE. Biztonsági megfontolásokból nem haladhatja meg a napi 5000 NE-t. A mesterségesen bevitt A-vitamin mennyiségbe jelen készítmény naponta alkalmazott mennyiségének A-vitamin tartalmát is bele kell számítani. A retinol kiválasztódik az anyatejbe, ezért az A-vitamin hozzáadásával készített kenőcs alkalmazása szoptatás idején nem javasolt.

Mellékhatás

Hyperszenzitivitási reakciók.