030/2020/01

Elixirium thymi compositum
(Elix. thymi comp.)

Elixirium thymi compositum FoNo VIII. 150,0 g

Expedíció

Sötét üvegben vagy műanyag tartályban, adagolókanállal.

Szignatúra

Adagolás az életkortól függően. Felbontás után 14 napig használható. Hűtőszekrényben tartandó.

Expectorans.

ATC besorolás: a köhögés és meghűlés gyógyszerei – köptetők – R05CA.

Fontos tudnivalók

10 ml készítmény kb. 4,6 g szacharózt tartalmaz.

Adagolási javaslat:

	szokásos egyszeri	szokásos napi
Felnőttnek	10 ml	30 ml
15-18 év	10 ml	30 ml
9-15 év	8 ml	24 ml
6-9 év	6 ml	18 ml

Hatóanyagok

Tinctura thymi: *expectorans.* (A Thymus vulgaris Növényi ATC kódja: HR05WA5059).

Javallat

A tracheobronchialis rendszer gyulladásos folyamatai. Produktív köhögés.

Ellenjavallat

A készítmény összetevőivel és az árvacsalánfélék (Lamiaceae) családjába tartozó növényekkel szemben fennálló túlérzékenység, 6 év alatti életkor. Alkalmazása tilos vékony- és vastagbélgyulladás (enterocolitis), asthma, vagy szívelégtelenség fennállása esetén.

Figyelmeztetés

A készítmény 1 adagja (10 ml) kb. 4,6 g szacharózt tartalmaz. Ritkán előforduló, örökletes fruktóz intoleranciában, glükóz-galaktóz malabszorpcióban, vagy szacharáz-izomaltáz hiányban a készítmény nem szedhető. A készítmény 1 adagja (10 ml) 1,2 g alkoholt tartalmaz. Magas rizikó faktorú betegek esetén (pl. májbetegség vagy epilepszia) a készítmény szedése nem javasolt. Orvosi konzultáció szükséges abban az esetben, ha az alkalmazás ideje alatt a tünetek továbbra is fennmaradnak, esetleg rosszabbodnak. Adatok hiányában a terhesség, szoptatás időszakában alkalmazása nem javasolt.

Mellékhatás

Előfordulhatnak túlérzékenységi reakciók, pl. nehézlégzés, bőrkiütés, csalánkiütés, faciális- száj- és torok ödéma (Quincke-ödéma), anafilaxiás sokk, gastrointestinalis tünetek (pl. görcsök, hányinger, hányás).