036/2020/01

Foeniculi dulcis fructus
(Foen. dulc. fruct.)

Javallat

Enyhe görcsökkel járó gyomor-bélrendszeri panaszok (ideértve a felfúvódást, gyomor- és bélgáz képződést) tünet kezelésére, valamint köptető megfázással járó köhögés esetén.

Összetétel

Hatóanyagok 5 ml adagban

1,5 g Édesköménytermés: *enyhe görcsoldó, váladékoldó, illóolaja révén enyhe antibakteriális hatású.*

Egyéb összetevők: –.

Tárolás

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Különleges tárolást nem igényel.

Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.

Alkalmazással kapcsolatos fontos tudnivalók

Felnőttek részére egyszeri adag: 1,5-2,5 g (kb. 5-9 ml) édesköménytermést 2,50 dl forró vízzel leöntünk, 15 percig főzünk, majd megfelelő hőmérsékletre hűtve gyógyteaként fogyasztható, naponta legfeljebb háromszor. Ha a tünetek hosszabb ideig fennállnak vagy súlyosbodnak, orvoshoz kell fordulni.

12-18 év közötti gyermekek és serülők részére kizárólag enyhe görcsökkel járó gyomor-bélrendszeri panaszok (ideértve a felfúvódást, gyomor- és bélgáz képződést) kezelésére javallott. A teát a felnőtteké szerint készítjük el. Ha a tünetek 2 hétnél hosszabb ideig fennállnak vagy súlyosbodnak, orvoshoz kell fordulni.

4-12 éves gyermekek részére kizárólag görcsökkel járó gyomor-bélrendszeri panaszok (ideértve a felfúvódást, gyomor- és bélgáz képződést) tüneteinek kezelésére javallott. A napi adag 3-5 g (kb. 10-17 ml) frissen aprított édesköménytermésből az előzőek szerint elkészített gyógytea, három adagra elosztva. Ha a tünetek 1 hétnél hosszabb ideig fennállnak vagy súlyosbodnak, orvoshoz kell fordulni.

Gyermekek elől gondosan el kell zárni! A teakeverék felhasználhatósági időtartama: 1 hónap.

Ellenjavallat

Az alábbi esetekben Önnél nem alkalmazható a készítmény.

Édesköménytermével, valamint az Apiaceae (Umbelliferae, ernyős virágúak) családba tartozó más növényekkel (pl. ánizs, kömény, zeller, koriander és kapor), vagy anetollal szembeni ismert túlérzékenység.

Figyelmeztetés

Az alábbi esetekben a készítmény alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Ha a tünetek a kezelés alatt súlyosbodnak, orvoshoz kell fordulni. Adatok hiányában terhes és szoptató nőknek nem ajánlott. 4 éves kor alatti gyermekeknek történő alkalmazására csak a gyermekorvos javaslata alapján, az általa meghatározott elkészítési és adagolási utasítás szerint kerülhet sor.

Lehetséges mellékhatás

Ha Önnél bármelyik, alább felsorolt vagy egyéb mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A bőr és légutak allergiás reakciói, nem ismert valószínűséggel.

Allergiás tünet észlelése esetén hagyja abba a gyógyszer alkalmazását. Amennyiben Ön súlyos allergiás tüneteket, vagy egyéb súlyos mellékhatást észlel, hagyja abba a gyógyszer alkalmazását, és azonnal kérjen orvosi segítséget.