051/2020/01

Infusum ipecacuanhae
(Inf. ipecac.)

Javallat

A légcső és a hörgők fokozott váladékképződéssel járó megbetegedései.

Összetétel

Hatóanyag 1 ml oldatban

0,015 g Standardizált ipekakuána-tinktúra: *köptető*.

Egyéb összetevők: ánizsos szesz, tisztított víz, metil-parahidroxibenzoát, 96%-os etanol, narancs-szirup (csak az ízesített változatban), málna-szirup (csak az ízesített változatban).

Tárolás

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Hűtőszekrényben tartandó.

Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.

Alkalmazással kapcsolatos fontos tudnivalók

Naponta 3-4-szer 15 ml-t étkezés után bevenni. Szükség esetén a készítmény ízesített változatban is elkészíthető. Az ízesített változat egy adagja (15 ml) 2,7 g szacharózt tartalmaz.

Ellenjavallat

Az alábbi esetekben Önnél nem alkalmazható a készítmény.

12 év alatti életkor. 12 év alatti gyermekeknél a kisebb hatóanyag koncentrációjú Infusum ipecacuanhae mite készítmény alkalmazható. A készítmény összetevőivel szembeni ismert túlérzékenység, súlyos vese vagy májkárosodás fennállása esetén, súlyos légzési elégtelenség, szív megbetegedés. Terhesség, szoptatás időszaka.

Figyelmeztetés

Az alábbi esetekben a készítmény alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Az ízesített változat 1 adagja (15 ml) kb. 2,7 g szacharózt tartalmaz. A javasolt adagolás szerinti használat esetén egy napi adag maximum 10,8 g szacharózt tartalmaz. Táplálkozási zavarok esetén az ipekakuána a szervezetben felhalmozódik, szívizom és izom elváltozásokat okozhat. A fennálló szív-és érrendszeri elváltozások súlyosbodásának veszélyét a felszívódott ipekakuána fokozza. Orvosi konzultáció szükséges, ha az alkalmazás ideje alatt a légúti panaszok, tünetek továbbra is fennmaradnak, esetleg rosszabbodnak, illetve ha nehézlégzés, láz, vagy gennyes váladéktermelődés jelentkezik.

Lehetséges mellékhatás

Ha Önnél bármelyik, alább felsorolt vagy egyéb mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Ritkán szívizom bántalom, álmosság, letargia, izombántalom, nyelőcső károsodás, magas dózisban történő alkalmazás esetén hányinger, hányás jelentkezhet.

Allergiás tünet észlelése esetén hagyja abba a gyógyszer alkalmazását. Amennyiben Ön súlyos allergiás tüneteket, vagy egyéb súlyos mellékhatást észlel, hagyja abba a gyógyszer alkalmazását, és azonnal kérjen orvosi segítséget.