051/2020/01

Infusum ipecacuanhae
(Inf. ipecac.)

Expectorans. Phytotherapeuticum.

ATC besorolás: a köhögés és meghűlés gyógyszerei - Ipecacuanha R05CA04.

Javallat

A légcső és a hörgők fokozott váladékképződéssel járó megbetegedései.

Rp.

Ipecacuanhae tincturae normatae

grammata tria (g 3,0)

Spiritus anisati FoNo VIII.

grammata duo (g 2,0)

Solutionis conservantis FoNo VIII.

gramma unum (g 1,0)

Aquae purificatae

ad grammata ducenta (ad g 200,0)

M. f. solutio.
D.S.: Naponta 3-4-szer 15 ml-t étkezés után bevenni. Hűtőszekrényben tartandó!
Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.

Fontos tudnivalók

Szükség esetén a készítmény a következő ízesített változatban is rendelhető: Ipecacuanhae tinctura normata 3,0 g, Sirupus aurantii vel Sirupus rubi idaei 60,0 g, Solutio conservans 1,0 g, Aqua purificata ad 200,0 g (136,0 g). Az ízesített változat egy adagja (15 ml) mintegy 2,7 g szacharózt tartalmaz.

Hatóanyagok

Ipecacuanhae tinctura normata: *expectorans.*

Ellenjavallat

12 év alatti életkor. 12 év alatti gyermekeknél a kisebb hatóanyag koncentrációjú Infusum ipecacuanhae mite készítmény alkalmazható. A készítmény összetevőivel szembeni túlérzékenység, súlyos vese vagy májkárosodás fennállása esetén, súlyos légzési elégtelenség, szív megbetegedés. Terhesség, szoptatás időszaka.

Figyelmeztetés

Az ízesített változat 1 adagja (15 ml) kb. 2,7 g szacharózt tartalmaz. A javasolt adagolás szerinti használat esetén egy napi adag maximum 10,8 g szacharózt tartalmaz. Táplálkozási zavarok esetén az ipekakuána akkumulálódik; cardiotoxikus és myopathiás elváltozásokat okozhat. A fennálló cardiovascularis elváltozások súlyosbodásának veszélyét az abszorbeálódott ipekakuána fokozza. Orvosi konzultáció szükséges, ha az alkalmazás ideje alatt a légúti panaszok, tünetek továbbra is fennmaradnak, esetleg rosszabbodnak, illetve ha nehézlégzés, láz, vagy purulens váladéktermelődés jelentkezik.

Mellékhatás

Ritkán cardiomyopathia, álmosság, lethargia, hasmenés, myopathia, oesophagus laceratio alakulhat ki. Magas dózisban történő alkalmazása esetén hányinger, hányás.