055/2020/01

Klysma laxans
(Klysm. lax.)

Laxativum.

ATC besorolás: székrekedés elleni egyéb szerek – glycerin A06AX01.

Javallat

Alkalmi obstipatio tüneti kezelésére.

Rp.

Natrii citratis

centigrammata nonaginta (g 0,90)

Natrii laurilsulfatis

centigrammata decem (g 0,10)

Sirupi sorbitoli FoNo VIII.

grammata quattuor et centigrammata triginta (g 4,3)

Glyceroli 85%

grammata tria (g 3,0)

Solutionis conservantis FoNo VIII.

centigrammata viginti (g 0,20)

Aquae purificatae

ad grammata decem (ad g 10,0)

M. f. solutio.

D.S.: Hashajtó klizma. Testhőmérsékletre melegítve egyszerre beadni.

Fontos tudnivalók

3 év feletti gyermeknek az adag felét kell adni. Orvosi felügyelet nélkül legfeljebb 1-3 napig alkalmazható.

Hatóanyagok

Natrii citras: *laxatív hatású.*

Glycerolum 85 per centum: *laxatívumként székrekedés kezelésére*.

Ellenjavallat

A készítmény hatóanyagaival, egyéb összetevőivel szembeni túlérzékenység. Veseelégtelenség, oliguria, azotaemia, anuria, dehydratio. Bélelzáródás vagy ismeretlen eredetű hasi fájdalom. A gyógyszer alkalmazása kerülendő nodus haemorrhoidalis kiújulása, analis fissura vagy haemorrhagiás rectocolitis esetén. A gyógyszer nem használható kombinációban kalcium- vagy nátrium-polisztirol-szulfonát kationcserélő gyantával (oralis vagy rectalis alkalmazási mód) az esetlegesen halálos vastagbélnekrózis kockázata miatt. 3 év alatti gyermekek.

Figyelmeztetés

A beteg forduljon orvoshoz, ha a tünetek néhány napnál tovább fennállnak, és kerülje a hosszantartó használatot. A székrekedés gyógyszeres kezelése csupán kiegészítő intézkedés az egészséges életmód

mellett. A vastagbél gyulladásos vagy fekélyes betegségeiben, illetve akut gastrointestinalis betegségben szenvedő betegek csak gondos mérlegelést követő orvosi döntés alapján, orvosi felügyelettel alkalmazhatják. A gyógyszer alkalmazása a terhesség és szoptatás ideje alatt - kizárólag szükség esetén - orvosi megfontolás tárgyát képezheti.

Kölcsönhatás

Kalcium- vagy nátrium-polisztirol-szulfonát kationcserélő gyantával való interakció. A szorbit és a kalcium- vagy nátrium-polisztirol-szulfonát (oralis/rectalis alkalmazás) együttes alkalmazása ellenjavallt, az esetlegesen halálos vastagbélnekrózis kockázata miatt.

Mellékhatás

Hasi diszkomfortérzet, hasi és felhasi fájdalom. Anorectalis diszkomfort. Hasmenés, dehydratio, nyálkahártya irritáló hatás előfordulhat.