056/2020/01

Linimentum ad pernionem

(Linim. ad pernion.)

I.	**Camphora racemica**	**2,0 g**
I.	**Collodium**	**10,0 g**
II.	**Ichthammolum**	**4,0 g**
III.	**Solutio iodi alcoholica FoNo VIII.**	**4,0 g**

Készítés

Az I. alatti alkotórészek oldatához a II-at, végül a III-at elegyítjük.

Expedíció

Sötét üvegben.

Szignatúra

Külsőleg. Fagybalzsam. Ecsetelésre. Használat előtt felrázandó.

Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.

Dermatologicum. Antiphlogisticum.

ATC besorolás: kátrányszármazékok D05AA.

Fontos tudnivalók

A beteg félpercenként váltogatott meleg-hideg láb-, illetőleg kézfürdőket vesz, összesen mintegy 10 percen át. Letörlés után a fagycsomókat bekeni. Ezt a kezelést több, egymást követő napon naponta 1-szer, esetleg 2-szer meg kell ismételni. A váltogatott meleg-hideg láb-, kézfürdők helyett 10-15 percig tartó 42-45 °C-os meleg vízben történő áztatás is alkalmazható. A gyógyszer enyhén színező, ezért cérnakesztyű használata célszerű.

Hatóanyagok

Camphora racemica: *bőrizgató, rubefaciens, antiphlogisticum. Hűsítő, local anaestheticum, analgeticum, viszketéscsillapító, enyhe antisepticus hatással rendelkezik.*

Ichthammolum: *antisepticum, antiphlogisticum, keratoplasztikus hatású. Antisepticum. Antimycoticum. Resorbens.*

Iodum (Solutio iodi alcoholica hatóanyaga)**:** *antisepticum, antimycoticum, resorbens.*

Javallat

Perniosis.

Ellenjavallat

A készítmény összetevőivel szembeni ismert túlérzékenység. Jódérzékenység. Hyperthyreosis, vagy más acut pajzsmirigybetegség. Dermatitis herpetiformis (Duhring betegség). Nyílt seben, sérült bőrön, nyálkahártyán nem alkalmazható. 3 év alatti életkor.

Figyelmeztetés

A bőrt, ruhát elszínezi. Gyermekek elől elzárandó. Pajzsmirigybetegségekben szenvedőknél - pl. golyva, pajzsmirigygöbök, vagy más nem acut pajzsmirigybetegségek - a nagymennyiségű jódbevitel hyperthyreosist indukálhat. Ezeknél a betegeknél csak a lehető legrövidebb ideig és a legkisebb kiterjedésben használjuk. 3-6 év közötti életkorban a készítmény csak orvosi javaslatra alkalmazható, a lehető legkisebb adagban. Terhesség és szoptatás ideje alatt a készítmény használata csak a legindokoltabb esetben történjen és a lehető legkisebb mennyiség alkalmazásával, mivel a felszívódott jód átjut a placentán, és az anyatejbe is kiválasztódik, valamint az embriók és az újszülöttek fokozottan érzékenyek a jodidra. Szembe nem kerülhet.

Mellékhatás

Bőrirritáció, túlérzékenységi reakció, allergiás dermatitis előfordulhat.