066/2020/01

Mixtura solvens
(Mixt. solv.)

Javallat

A légutak hurutos megbetegedéseinek kezelésére alkalmazható készítmény.

Összetétel

Hatóanyagok 1 ml készítményben

0,025 g Ammónium-klorid: *nyákoldó*.

Egyéb összetevők: metil-parahidroxibenzoát, 96%-os etanol, folyékony édesgyökér-kivonat, szorbinsav, szacharóz, tisztított víz.

Tárolás

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Különleges tárolást nem igényel.

Alkalmazással kapcsolatos fontos tudnivalók

10 ml készítmény 0,5 g szacharózt tartalmaz. *Alkalmazási mód*: naponta 4-szer 10 ml-t bevenni. Felbontás után 1 hónapig használható.

Ellenjavallat

Az alábbi esetekben Önnél nem alkalmazható a készítmény.

Súlyos máj- és veseelégtelenség. Terhesség, szoptatás időszaka.

Figyelmeztetés

Az alábbi esetekben a készítmény alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

A kezelés során az ammónia toxicitás jeleinek megjelenését figyelni kell. Összeférhetetlenség áll fenn egyes műanyagokkal szemben. 18 év alatti életkorban klinikai adatok hiányában alkalmazása nem javasolt.

Kölcsönhatás

Tájékoztassa kezelőorvosát, gyógyszerészét, ha az alábbiakban említett gyógyszerek közül bármelyiket is alkalmazza.

Lúgokkal, nátrium-hidrogén-karbonáttal, kodeinnel nem adható együtt.

Tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben alkalmazott, valamint alkalmazni tervezett egyéb gyógyszereiről is.

Lehetséges mellékhatás

Ha Önnél bármelyik, alább felsorolt vagy egyéb mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Tartósabb alkalmazás során alacsony plazma kálium szint, anyagcserezavar okozta savasodás (fejfájás, mentális zavarok, lokális és valamennyi izmot érintő izomrángás, görcs, lassú szívverés, szívritmuszavar) alakulhat ki.

Allergiás tünet észlelése esetén hagyja abba a gyógyszer alkalmazását. Amennyiben Ön súlyos allergiás tüneteket, vagy egyéb súlyos mellékhatást észlel, hagyja abba a gyógyszer alkalmazását, és azonnal kérjen orvosi segítséget.