067/2022/02

Mucilago ad catheterem
(Mucil. ad cathet.)

Local anaestheticum. Antisepticum.

ATC besorolás: helyi érzéstelenítők – lidocain N01BB02.

Javallat

Katétercsúsztató.

Rp.

Lidocaini hydrochloridi

grammata duo (g 2,0)

Mucilaginis hydroxyaethylcellulosi FoNo VIII.

grammata octoginta unum et centigrammata triginta (g 81,3)

Solutionis conservantis FoNo VIII.

gramma unum (g 1,0)

Aquae ad iniectabilia

ad grammata centum (ad g 100,0)

M. f. mucilago.

D. ad vitrum sterilisabile cum epistomio.

S.: Külsőleg. Katétercsúsztató. Hűtőszekrényben tartandó! Felbontástól számítva 1 hétig használható fel.

Felhasználhatósági időtartam 3 hónap.

Fontos tudnivalók

A katétert ne mártsuk a csúsztatószerbe, hanem a szükséges legkisebb mennyiséget cseppentsük közvetlenül a katéterre.

Hatóanyagok

Lidocaini hydrochloridum: *savamid típusú, membránstabilizáló hatásmechanizmusú local anaestheticum. Hatása gyorsan beáll, hatástartama rövid. Gátolja mind az ingerület kifejlődését, mind tovaterjedését.*

Ellenjavallat

A készítmény összetevőivel szembeni ismert túlérzékenység. Parabén túlérzékenység. Congestiv szívelégtelenség. 6 éves kor alatt a készítmény nem alkalmazható.

Figyelmeztetés

A lidokain jól felszívódik a nyálkahártyáról. Ezt elsősorban gyermekek kezelése esetén kell figyelembe venni. Óvatosan alkalmazandó sérült vagy fertőzött nyálkahártyán, epilepsziás betegnél, továbbá bradycardia esetén és amennyiben májfunkciós zavar áll fenn.

Kölcsönhatás

A lidokain óvatosan alkalmazandó olyan betegeknél, akik 1B vagy 3 csoportba tartozó antiarrhythmiás készítményeket szednek, mint például tokainid, mexiletin ill. amiodaron, mert a toxikus hatások összeadódhatnak.

Mellékhatás

Az alkalmazás helyén átmeneti erythaema, oedema, érzékelési zavar alakulhat ki. Nagyon ritkán előfordulhatnak túlérzékenységi allergiás reakciók: urticaria, angioedema, bronchospasmus, legsúlyosabb esetben anaphylaxias shock. A készítmény előírás szerint történő használata esetén szisztémás mellékhatások előfordulása ritka.