

074/2020/01



Oculentum neomycini
(Oculent. neomycin.)

Ophthalmicum. Aminoglycosid antibiotikum.

ATC besorolás: szemészeti készítmények – neomicin S01AA03.

Javallat

Bakteriális eredetű acut conjunctivitis, keratitis.

Rp.

Neomycini sulfatis

centigrammata quinque (g 0,05)

Aquae ad iniectabilia

gramma unum (g 1,0)

Oculenti simplicis FoNo VIII.

ad grammata decem (ad g 10,0)

M. f. oculentum.

D.S: Külsőleg. Szemkenőcs. [A pontos adagolást a vényen az orvosnak minden esetben fel kell tüntetnie.] **Felbontástól számítva 2 hétig használható fel. Hűtőszekrényben tartandó!**

Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.

Fontos tudnivalók

Csak vényre adható ki. Erős hatású szert tartalmaz.

Hatóanyagok

Neomycini sulfas: számos Gram-negatív kórokozóra és néhány *Staphylococcus aureus* törzsre ható aminoglikozid antibiotikum.

Ellenjavallat

Ismert aminoglikozid-allergia.

Figyelmeztetés

Elhúzódó alkalmazása kerülendő sensitisatio veszélye miatt. Terhesség és szoptatás időszakában alkalmazása nem ajánlott.

Kölcsönhatás

Némely beta-lactam antibiotikummal az aminoglikozidok inkompatibilisek *in vitro* körülmények között.

Mellékhatás

Az alkalmazás helyén túlérzékenységi reakció, viszketés alakulhat ki.