100/2020/01

✠

Ovulum nystatini

(Ovul. nystatin.)

Javallat

A hüvely gombás fertőzésének kezelésére alkalmas hüvelykúp.

Összetétel

Hatóanyagok 1 db hüvelykúpban

0,10 g Nisztatin: *elsősorban a leggyakrabban előforduló hüvelyfertőzést okozó gomba (candida albicans) ellen alkalmazható. Egyéb gombás fertőzésekben is hatásos*.

Egyéb összetevők: tejsav, makrogol 1500, szorbitán-laurát.

Tárolás

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Hűtőszekrényben tartandó.

Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.

Alkalmazással kapcsolatos fontos tudnivalók

Csak vényre kapható. Erős hatású szert tartalmaz. Az orvos által megadott használati utasítást minden esetben be kell tartani. Ha az orvos másképp nem rendeli szokásos adagja: 10 napon át naponta 1 hüvelykúpot mélyen a hüvelybe helyezni lefekvés előtt.

Ellenjavallat

Az alábbi esetben Önnél nem alkalmazható a készítmény.

Nisztatinnal szembeni ismert túlérzékenység.

Lehetséges mellékhatás

Ha Önnél bármelyik, alább felsorolt vagy egyéb mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Ritkán helyi nyálkahártya izgalom, túlérzékenység.

Allergiás tünet észlelése esetén hagyja abba a gyógyszer alkalmazását. Amennyiben Ön súlyos allergiás tüneteket, vagy egyéb súlyos mellékhatást észlel, hagyja abba a gyógyszer alkalmazását, és azonnal kérjen orvosi segítséget.