100/2020/01

✠

Ovulum nystatini

(Ovul. nystatin.)

I.	**Nystatinum**	**1,0 g**
II.	**Acidum lacticum**	**0,50 g**
III.	**Massa macrogoli FoNo VIII.**	**qu.s.**

10 db hüvelykúpra

Készítés

A II-kal szuszpendáljuk az I-et, majd a megolvasztott III-kal továbbszuszpendáljuk és formába öntéssel 10 db hüvelykúpot készítünk. Annyi vivőanyagot használjunk, hogy a hüvelykúpok átlagtömege kb. 2,5 g legyen.

Expedíció

Egyenként kasírozott alumíniumfóliába burkolva, kartondobozban.

Szignatúra

Külsőleg. Hüvelykúp. [A vényen szereplő adagolás.] Hűtőszekrényben tartandó.

Eltartás gyógyszertárban

Hűvös helyen vagy hűtőszekrényben tartandó.

Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.

Antimycoticum.

ATC besorolás: gombásodás elleni lokális készítmények – antibiotikumok – nisztatin D01AA01.

Fontos tudnivalók

Csak vényre adható ki. Erős hatású szert tartalmaz. *Szokásos adagolás*: *10 napon át naponta 1 hüvelykúpot mélyen a hüvelybe helyezni lefekvés előtt.*

Hatóanyagok

Nystatinum: *elsősorban candida albicans okozta fertőzésekben alkalmazható. Ezenkívül hatásos Blastomyces dermatitis, brasiliensis, coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, Hystoplasma capsulatum és Epidermophyton speciesek ellen.*

Javallat

Hüvely mycosis.

Ellenjavallat

Nystatinnal szemben ismert túlérzékenység.

Mellékhatás

Ritkán helyi irritáció, túlérzékenység.