100/2020/01

✠

Ovulum nystatini

(Ovul. nystatin.)

Antimycoticum.

ATC besorolás: gombásodás elleni lokális készítmények – antibiotikumok – nisztatin D01AA01.

Javallat

Hüvely mycosis.

Rp.

Nystatini

centigrammata decem (g 0,10)

Acidi lactici

centigrammata quinque (g 0,05)

Vehiculi

quantum satis

M. f. ovulum.

Dentur tales doses No decem (X).

D.S.: Külsőleg. Hüvelykúp. [A pontos adagolást a vényen az orvosnak minden esetben fel kell tüntetnie.] **Hűtőszekrényben tartandó!**

Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.

Fontos tudnivalók

Csak vényre adható ki. Erős hatású szert tartalmaz. *Szokásos adagolás*: *10 napon át naponta 1 hüvelykúpot mélyen a hüvelybe helyezni lefekvés előtt.*

Hatóanyagok

Nystatinum: *elsősorban candida albicans okozta fertőzésekben alkalmazható. Ezenkívül hatásos Blastomyces dermatitis, brasiliensis, coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, Hystoplasma capsulatum és Epidermophyton speciesek ellen.*

Ellenjavallat

Nystatinnal szemben ismert túlérzékenység.

Mellékhatás

Ritkán helyi irritáció, túlérzékenység.