101/2020/01

Paraffinum aromaticum

(Paraff. aromat.)

Javallat

Idült székrekedés alkalmankénti kezelése.

Összetétel

Hatóanyagok

Folyékony paraffin: *csúsztató hatású hashajtó (a széklet lágyságát biztosítja).*

Egyéb összetevők: citromolaj.

Tárolás

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Különleges tárolást nem igényel.

Alkalmazással kapcsolatos fontos tudnivalók

Naponta a beteg életkorától függően 15-45 ml-t éhgyomorra bevenni. Este közvetlenül lefekvés előtt vagy reggel üres gyomorra célszerű bevenni. Bevételét könnyíti, ha a kanálba töltés előtt a kanalat meleg vízbe mártjuk. A folyékony paraffin a székletet felhígítja és azzal kiürül.

Ellenjavallat

Az alábbi esetekben Önnél nem alkalmazható a készítmény.

Hányinger, hányás, nem diagnosztizált hasi fájdalom, vakbélgyulladás, májgyulladás, nyelési zavarok, ágyban fekvő beteg, kálium-vesztéssel járó állapotok, kiszáradás. Terhesség, szoptatás. Ismert túlérzékenység paraffinnal vagy citrus-illóolajokkal szemben. 12 év alatti életkor.

Figyelmeztetés

Az alábbi esetekben a készítmény alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Tartósan alkalmazva gátolja a zsíroldékony vitaminok felszívódását, ezért tartós használata kerülendő. Folyamatosan legfeljebb 1 hétig szedhető. Étkezés közben ne vegyük be! Végbélvérzés esetén csak a vérzés okának megállapítása után adható. Gyermekek, idősek, szellemi fogyatékos vagy nyelési zavarban szenvedő betegek esetében félrenyelés fordulhat elő, ami lipoid tüdőgyulladást okozhat. A zsírban oldódó vitaminokat is magával viheti, ezért hosszas szedése A-, esetleg D-vitaminhiányt okozhat.

Kölcsönhatás

A gyomor-bél traktusból nem szívódik fel, a zsírban oldódó vitaminok felszívódását gátolja.

Tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben alkalmazott, valamint alkalmazni tervezett egyéb gyógyszereiről is.

Lehetséges mellékhatás

Ha Önnél bármelyik, alább felsorolt vagy egyéb mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Nagy dózisban végbél körüli izgalmat, kontrolálatlan széklet ürítést, a végbélnyílás viszketését válthatja ki. Idegentest reakciót, hozzászokást okozhat. Ritkán túlérzékenységi reakciók, kiütés, viszketés, torok- és nyelvduzzanat, szédülés, légzési nehézség fordulhatnak elő. Ilyenkor azonnal orvoshoz kell fordulni!

Allergiás tünet észlelése esetén hagyja abba a gyógyszer alkalmazását. Amennyiben Ön súlyos allergiás tüneteket, vagy egyéb súlyos mellékhatást észlel, hagyja abba a készítmény alkalmazását, és azonnal kérjen orvosi segítséget.