103/2020/01

Pasta antirheumatica
(Past. antirheum.)

Javallat

Rheumatikus fájdalmak enyhítése, pakolásként alkalmazva.

Összetétel

Hatóanyagok 1 g pasztában

0,1 mg Jód: *fertőtlenítő, gombaellenes hatású szer.*

0,6 mg Eukaliptuszolaj: *fertőtlenítő hatású.*

0,6 mg Borsosmentaolaj: *simaizomgörcsoldó, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, helyileg alkalmazva izgatja a hidegérzékeny receptorokat, ezért hosszan tartó hidegérzést okoz, melyet fájdalomcsökkentő hatás követ.*

1,1 mg Metil-szalicilát: *fájdalomcsökkentő, gyulladásgátló.*

0,7 mg Szalicilsav: *a bőr hámrétegét oldó és gombaellenes szer, gyulladásgátló.*

Egyéb összetevők: kálium-jodid, 70%-os alkohol, kaolin, talkum, 85%-os glicerin, tisztított víz.

Tárolás

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Különleges tárolást nem igényel.

Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.

Alkalmazással kapcsolatos fontos tudnivalók

Szokásos alkalmazás: a pasztát ujjnyi vastagon kenje fel körben a fájdalmas ízületre és tekerje körbe néhány réteg gézzel. Ezután borítsa be papírvattával, végül rugalmas pólyával (fásli) rögzítse. 12/24 óráig maradhat a pakolás az ízületen. A pakolás eltávolítása után a paszta langyos vízzel könnyen lemosható. Gyulladt ízület esetén a pakolás előtt javasolható az ízület néhány percig tartó, jégzselével történő hűtése.

Ellenjavallat

Az alábbi esetekben Önnél nem alkalmazható a készítmény.

Hámfelmaródás. Nyílt, nedvedző seben, irritált bőrfelületen nem alkalmazható. A készítmény hatóanyagaival, valamint mentollal vagy a mentacsaládba tartozó növényekkel szembeni ismert túlérzékenység. Pajzsmirigy megbetegedés. Terhesség, szoptatás időszaka, 15 év alatti életkor.

Figyelmeztetés

Szemtől és nyálkahártyáktól távol kell tartani. Hosszú ideig, nagy mennyiségben, kiterjedt testfelületen nem alkalmazható mivel a szalicilsav és a metil-szalicilát a bőrön keresztül gyorsan felszívódhat, és így szisztémás szalicilát mérgezést okozhat. Ha tünetei a gyógyszer használata során nem enyhülnek, vagy rosszabbodnak, orvoshoz kell fordulni.

Kölcsönhatás

Tájékoztassa kezelőorvosát, gyógyszerészét, ha az alábbiakban említett gyógyszerek közül bármelyiket is alkalmazza.

Lítiummal együtt adva a pajzsmirigy elégtelen működését kiváltó hatás növekedhet. A készítményben található szalicil-származékok bőrről felszívódva fokozhatják a véralvadásgátlók hatását. Fényterápia előtt nem alkalmazható.

Tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben alkalmazott, valamint alkalmazni tervezett egyéb gyógyszereiről is.

Lehetséges mellékhatás

Ha Önnél bármelyik, alább felsorolt vagy egyéb mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Jódallergia, bőrkiütés. Irritálhat és túlérzékenységi reakciót (bőrreakciók, fejfájás, lassult szívverés, izomremegés, mozgáskordináció zavara) válthat ki.

Allergiás tünet észlelése esetén hagyja abba a gyógyszer alkalmazását. Amennyiben Ön súlyos allergiás tüneteket, vagy egyéb súlyos mellékhatást észlel, hagyja abba a gyógyszer alkalmazását, és azonnal kérjen orvosi segítséget.