103/2020/01

Pasta antirheumatica

(Past. antirheum.)

I.	**Solutio iodi alcoholica FoNo VIII.**	**0,80 g**
II.	**Kalii iodidum**	**0,05 g**
III.	**Eucalypti aetheroleum**	**0,20 g**
III.	**Menthae piperitae aetheroleum**	**0,20 g**
IV.	**Methylis salicylas**	**0,40 g**
V.	**Acidum salicylicum**	**0,25 g**
VI.	**Alcoholum dilutum 70%**	**2,50 g**
VII.	**Kaolinum ponderosum**	**72,2 g**
VII.	**Talcum**	**72,2 g**
VIII.	**Glycerolum 85 per centum**	**200,0 g**

Készítés

A II. és az V. alatti alkotórészeket oldjuk a VI-ban. Az oldathoz elegyítjük az I-et, a IV-et és a VIII-at, majd hozzácseppentjük a III. alatti komponenseket. Végül dörzsmozsárban homogenizáljuk a VII. alatti alkotórészeket és a fenti folyadékkal szuszpendáljuk a porkeveréket.

Expedíció

Tégelyben.

Szignatúra

Külsőleg. Paszta ízületi pakolásra.

Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.

Antirheumaticum. Derivans.

ATC besorolás: gyulladásgátlók és reuma ellenes készítmények M01.

Fontos tudnivalók

Szokásos alkalmazás: a pasztát ujjnyi vastagon kenje fel körben a fájdalmas ízületre és tekerje körbe néhány réteg gézzel. Ezután borítsa be papírvattával, végül rugalmas pólyával (fásli) rögzítse. 12/24 óráig maradhat a pakolás az ízületen. A pakolás eltávolítása után a paszta langyos vízzel könnyen lemosható. Gyulladt ízület esetén a pakolás előtt javasolható az ízület néhány percig tartó, jégzselével történő hűtése.

Hatóanyagok

Iodum (Solutio iodi alcoholica hatóanyaga)**:** *antisepticum. Antimycoticum. Resorbens. Derivans.*

Eucalypti aetheroleum: *antisepticum, derivans.*

Menthae piperitae aetheroleum: *spasmolyticum, antisepticum, antiphlogisticum, helyileg alkalmazva izgatja a hidegérzékeny receptorokat, ezért hosszan tartó hidegérzést okoz, melyet analgetikus hatás követ.*

Methylis salicylas: *analgeticum, antiphlogisticum.*

Acidum salicylicum: *keratolytikus és fungicid hatású antiphlogisticum.*

Javallat

Rheumatikus fájdalmak enyhítése, pakolásként alkalmazva.

Ellenjavallat

Hámfelmaródás. Nyílt, nedvedző seben, irritált bőrfelületen nem alkalmazható. A készítmény hatóanyagaival, valamint mentollal vagy a mentacsaládba tartozó növényekkel szembeni ismert túlérzékenység. Pajzsmirigy megbetegedés. Terhesség, szoptatás időszaka, 15 év alatti életkor.

Figyelmeztetés

Szemtől és nyálkahártyáktól távol kell tartani. Hosszú ideig, nagy mennyiségben, kiterjedt testfelületen nem alkalmazható. mivel a szalicilsav és a metil-szalicilát a bőrön keresztül gyorsan abszorbeálódhat, és így szisztémás szalicilát mérgezést okozhat. Ha a beteg tünetei a gyógyszer használata során nem javulnak, vagy rosszabbodnak, orvosi ellenőrzés szükséges.

Kölcsönhatás

Lítiummal együtt adva a hypothyreotikus hatás fokozódhat. A készítményben található szalicil-származékok bőrről felszívódva fokozhatják az oralis antikoagulánsok hatását. Phototherapia előtt nem alkalmazható.

Mellékhatás

Jódallergia, bőrkiütés. Irritálhat és túlérzékenységi reakciót (erythemás bőrreakciók, fejfájás, bradycardia, izomtremor, ataxia) válthat ki.