104/2020/01

✠

Pasta boraxata

(Past. boraxat.)

Dermatologicum. Antiphlogisticum.

ATC besorolás: bőrlágyító- és védőanyagok – cink készítmények D02AB.

Javallat

Kis kiterjedésű gyulladásos bőrfolyamatok kezelése, ha egyben a bőr szárítása is szükséges.

Rp.

Boracis

gramma semis (g 0,5)

Zinci oxidi

Glyceroli 85%

Talci

aa grammata duo et semis (aa g 2,5)

Unguenti oleosi FoNo VIII.

ad grammata viginti quinque (ad g 25,0)

M. f. pasta.

D.S.: Külsőleg. Gyulladáscsökkentő paszta. [A pontos adagolást a vényen az orvosnak minden esetben fel kell tüntetnie.]

Fontos tudnivalók

Csak vényre adható ki. *Szokásos adagolása*: 18 éves életkor felett naponta legfeljebb 4,5 g készítménnyel a bőrfelületet vékony rétegben be kell kenni. A készítményből 1 borsónyi mennyiség kb. 0,3 g-nak felel meg. Folyamatosan 7 napig alkalmazható.

A 18 éves korig alkalmazható legnagyobb napi mennyiségek:

év	legnagyobb napi mennyiség (g)
18	3,1 g
16	2,5 g
14	1,9 g
12	1,3 g
10	1,1 g
8	0,95 g
6	0,77 g
4	0,60 g
2	0,45 g

Hatóanyagok

Borax: *enyhe antimycoticum.*

Zinci oxidum: *enyhe adstringens és szárító hatású.*

Ellenjavallat

Hámfelmaródás. Nyílt sebre nem alkalmazható. 2 év alatti életkor, terhesség és szoptatás időszaka.

Figyelmeztetés

A szisztémás toxicitás veszélye miatt kerülendő az előírt adagok túllépése.

Mellékhatás

Allergia. A bőrön irritációt okozhat. A bór a nyálkahártyáról, hámfosztott területről felszívódva szisztémás toxikus reakciókat idézhet elő.