111/2020/01

✠

Pertica dithranoli

(Pertic. dithran.)

I.	**Dithranolum**	**2,0 g**
II.	**Theobromatis oleum**	**16,0 g**
III.	**Cera alba**	**32,0 g**
III.	**Ricini oleum virginale**	**qu.s.**
		10 db rúdra

Készítés

A III. alatti alkotórészek összeolvasztott keverékében homogenizáljuk az I-t, ezután további melegítés nélkül hozzáadjuk a II-at. 9,0 g átlagtömegű hüvelyhenger öntőformába öntjük. A készítéshez kb. 46 g ricinusolajat használjunk.

Expedíció

Stift-tartó műanyag tartályban.

Szignatúra

Külsőleg. Gyógyszeres rúd. Pikkelysömör gócainak kezelésére. [A vényen szereplő adagolás.] Hűtőszekrényben tartandó.

Eltartás gyógyszertárban

Hűvös helyen vagy hűtőszekrényben tartandó.

Dermatologicum. Antisporiaticum.

ATC besorolás: psoriasis elleni lokális készítmények – ditranol D05AC01.

Fontos tudnivalók

Csak vényre adható ki. Erős hatású szert tartalmaz. *Szokásos adagolás: a készítményt naponta egyszer kell alkalmazni és a felvitelt követő 1 óra múlva le kell mosni.*

Hatóanyagok

Dithranolum: *szintetikus kátrányszármazék, cytostaticus hatású anti-psoriaticum. Hatásmechanizmusa összetett. Psoriasis tüneteiben tartós remissziót eredményez.*

Javallat

Psoriasis.

Ellenjavallat

Ismert túlérzékenységi reakció, erythroderma, psoriasis pustulosa/acuta.

Figyelmeztetés

Sérült, gyulladt bőrfelületről a dithranol gyorsan és jelentős mennyiségben felszívódhat, a flexurákban csak óvatosan alkalmazható. Tartsuk távol a szemtől és nyálkahártyáktól, mivel súlyos irritációt okozhat. Amennyiben a psoriasis okozta laesio súlyosbodik, illetve kiterjedése növekszik, a készítmény használatát fel kell függeszteni.

Mellékhatás

Égető érzés a bőrön, különösen a világos bőrű embereknél érzékenységi reakciók, a bőr gyulladásos reakciója (erythema, bullosus elváltozás), bőr és hajelszíneződés előfordulhat, ami a kezelés abbahagyása után megszűnik. Neutrophilia.