137/2020/01

✠

Pulvis phenolphthaleini compositus

(Pulv. phenolphth. comp.)

Laxativum.

ATC besorolás: székrekedés elleni szerek – kontakt hashajtók – fenolftalein A06AB04.

Javallat

Obstipatio.

Rp.

Phenolphthaleini

centigrammata viginti (g 0,20)

Sulfuris pulverati loti

centigrammata quinque (g 0,05)

Sennae folioli

centigrammata decem (g 0,10)

Liquiritiae radicis

centigrammata decem (g 0,10)

Foeniculi amari fructus aetherolei

milligrammata quattuor et semis (g 0,0045)

M. f. pulvis.

Dentur tales doses No decem (X).

D.S.: Hashajtó. [A pontos adagolást a vényen az orvosnak minden esetben fel kell tüntetnie.]

Fontos tudnivalók

Csak vényre adható ki. Erős hatású szert tartalmaz. *Szokásos adagolás*: szükség esetén napi 1 port kevés vízzel bevenni. Folyamatosan legfeljebb 7 napig alkalmazható. A vizeletet pirosra színezheti.

Hatóanyagok

Phenolphthaleinum: *laxatív hatását elsősorban a vastagbél falát izgatva fejti ki. A vékonybélből egy része felszívódik és részben az epével kiválasztódva, még a beadás után 2-3 nappal is elősegíti a puha székletürítést.*

Sulfur pulveratum lotum: *a bélhuzamban keletkező kénhidrogén fokozza a bélperisztaltikát.*

Sennae foliolum: *a bélfalat izgató laxativum, diantron glikozidokat tartalmaz.*

Liquiritiae radix: *gyulladáscsökkentő, görcsoldó, gyomor- és nyombélfekély kezelésében adjuváns. Erősen édes íze miatt ízjavító.*

Foeniculi amari fructus aetheroleum: *carminativum, enyhe görcsoldó és az emésztőrendszerben a szekréciót fokozza.*

Ellenjavallat

A készítmény hatóanyagaival szembeni ismert túlérzékenység. 18 év alatti életkor. Az emésztőrendszer gyulladásos folyamatai, bélelzáródás, ismeretlen eredetű alhasi fájdalom, appendicitis; hepatitis;

kiszáradás, ismeretlen eredetű hasi fájdalom, víz-, elektrolitvesztés miatti dehydratio, hypokalaemiás állapotok. Terhesség, szoptatás időszaka.

Figyelmeztetés

Gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Krónikus adagolása növelheti a vastagbél kóros elváltozásának veszélyét, ezért folyamatosan legfeljebb 1 hétig alkalmazható. A fenolftalein állatkísérletekben tapasztalt karcinogén hatása humán alkalmazás során nem jelentkezett. Szívglikozid és vizelethajtó készítményt szedőknél óvatosan kell alkalmazni. A hatóanyagok átjutnak az anyatejbe, a szoptatott csecsemőben hasmenést, kólikás fájdalmat, exsiccosist okozhatnak. Tartós alkalmazás során hozzászokás alakulhat ki.

Kölcsönhatás

Szívglikoziddal együtt adva a káliumvesztés miatt a digitalis toxikus hatása fokozódhat. Karbenoxolon, corticosteroidok, thiazide vízhajtók, valamint amphotericin a készítménnyel történő egyidejű alkalmazás esetén a káliumvesztést fokozzák.

A készítmény okozta fokozott bélpassage egyéb gyógyszer egyidejű alkalmazása során azok felszívódásának, illetve hatásának csökkenését okozhatja. Opiátok, sedativumok, anticholinerg szerek, psychopharmaconok és antacidok (pl. alumínium-hidroxid) a hashajtó hatást csökkentik.

Mellékhatás

A készítmény összetevőivel szembeni túlérzékenységi reakciók, bőrkiütés, dermatitis, dehydratio, elektrolitveszteség (főleg kálium), görcsös hasi fájdalom, görcsös gyomor-bélpanaszok, flatulencia, meteorizmus, hasmenés, ritkán májkárosodás. Nátrium- és vízretenciót, valamint hypokalaemiát okozhat.