139/2020/01

Pulvis sennae compositus
(Pulv. sennae comp.)

Laxativum.

ATC besorolás: székrekedés elleni szerek – kontakt hashajtók – szenna-glikozidok, kombinációk A06AB56.

Javallat

Obstipatio.

Rp.

Pulveris sennae compositi FoNo VIII.

grammata quadraginta (g 40,0)

D.S.: Hashajtó. 5 ml porkeveréket kevés vízzel bevenni.

Fontos tudnivalók

Figyelmeztessük a beteget, hogy a gyógyszer a lúgos kémhatású vizeletet pirosra festheti. 5 ml porkeverék 1,2 g szacharózt tartalmaz.

Hatóanyagok

Foeniculi amari fructus aetheroleum: *carminativum, enyhe görcsoldó és az emésztőrendszerben a szekréciót fokozza.*

Sulfur pulveratum lotum: *a belekben keletkező kénhidrogén fokozza a bélperisztaltikát.*

Liquiritiae radix: *gyulladásgátló, görcsoldó, gyomor- és nyombélfekély kezelésében adjuváns. Erősen édes íze miatt ízjavító.*

Sennae foliolum: *a bélfalat izgató laxativum, diantron glikozidokat tartalmaz.*

Ellenjavallat

A hatóanyagokkal szembeni ismert túlérzékenység. Bélelzáródás, belek gyulladásos betegsége, ismeretlen eredetű hasi fájdalom, víz-, elektrolitvesztés miatti dehydratio, hypokalaemiás állapotok. 12 év alatti kor, terhesség, szoptatás.

Figyelmeztetés

Prostata hyperplasiában adását kerülni kell. Alhasi vérbőséget okoz. Hosszantartó alkalmazás kerülendő, mert az állatkísérletekben tapasztalt bélcsatornát károsító hatásai emberre is veszélyt jelenthetnek. A szennalevélből hashajtó hatású származék kerül az anyatejbe, és a csecsemőnek kólikás fájdalmat, hasmenést, exsiccosist okozhat. A szennozid napi adagja nem haladhatja meg a 30 mg-ot, amely megfelel 1,2 g szennalevélnek, illetve 6 g (kb. 11 ml) készítménynek. Legfeljebb 1 hétig alkalmazható.

Kölcsönhatás

Tartós alkalmazás esetén kálium vesztés miatt növeli a szívglikozidok toxikus hatását, és befolyásolja az antiarrhythmiás szerek hatását. A diuretikumok, kortikoszteroidok és az édesgyökér alkalmazása növeli a szennalevél által okozott káliumvesztést.

Mellékhatás

Allergiás reakciók, bőrkiütés, dermatitis**,** hasi fájdalom, görcsös gyomor-bélpanaszok, elektrolitveszteség (főleg kálium), ritkán májkárosodás.