142/2020/01

Rosae pseudo-fructus
(Ros. pseudo-fruct.)

Javallat

Nátha, megfázás kiegészítő kezelése.

Összetétel

Hatóanyagok 6 ml adagban

2 g Csipkerózsa áltermés: *C-vitamin tartalma miatt fokozza a szervezet ellenállóképességét, enyhe gyulladásgátló hatású.*

Egyéb összetevők: –.

Tárolás

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Különleges tárolást nem igényel.

Alkalmazással kapcsolatos fontos tudnivalók

10,0 g (kb. 30 ml) összetört csipkerózsa áltermést fél liter langyos vízzel leöntünk, gyakori kevergetés közben 2 órán át állni hagyjuk. Leszűrés után – tetszőlegesen ízesítve – fogyasztjuk, naponta több alkalommal is egy-egy csészényit. 3 ml csipkerózsa áltermés mintegy 1 g-nak felel meg. A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Ellenjavallat

Az alábbi esetben Önnél nem alkalmazható a készítmény.

Csipkerózsa álterméssel szembeni ismert túlérzékenység.

Figyelmeztetés

Ha a tünetek 1 hétnél hosszabb időn át fennállnak, vagy a kezelés ideje alatt súlyosbodnak, orvoshoz kell fordulni.

Lehetséges mellékhatás

Ha Önnél bármelyik, alább felsorolt vagy egyéb mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelő orvosát vagy gyógyszerészét.

Allergiás reakciók, nem ismert gyakorisággal.

Allergiás tünet észlelése esetén hagyja abba a gyógyszer alkalmazását. Amennyiben súlyos allergiás tüneteket, vagy egyéb súlyos mellékhatást észlel, hagyja abba a gyógyszer alkalmazását, és azonnal kérjen orvosi segítséget.