144/2020/01

Sal ad rehydrationem
(Sal ad rehydr.)

Oralis rehydráló terápia.

ATC besorolás: elektrolit oldatok B05XA.

Javallat

Rehydratio, elektrolitvesztés.

Rp.

Natrii chloridi

grammata tria et semis (g 3,5)

Kalii chloridi

gramma unum et semis (g 1,5)

Natrii citratis

grammata tria (g 3,0)

Glucosi anhydrici

grammata viginti (g 20,0)

M. f. pulvis.

D.S.: [A pontos adagolást a vényen az orvosnak minden esetben fel kell tüntetnie.] **Száraz helyen tartandó! Elkészítés után 24 óráig használható fel.**

Rendeléskor készítendő.

Fontos tudnivalók

Csak vényre adható ki. 20 g glükózt tartalmaz. Az orvosnak a beteggel minden esetben be kell tartatnia az általa megadott adagolási utasítást! Orvosi utasítás hiányában tájékoztatóul a *szokásos adagolás: 1 liter vízben oldva.* Nagyobb gyermekek és felnőttek enyhe és mérsékelten súlyos dehydratatiója (5-9% testtömeg veszteség 24 óra alatt) 50-80 ml/ttkg rehidráló folyadék bevitelével korrigálható. A számított mennyiségből a felnőttek 750 ml-t fogyasszanak óránként, ily módon a rehidrálás 3-5 óra alatt megtörténik. Fenntartó adagoláskor 40-50 ml/ttkg/24 h elegendő. Az idős betegek folyadékigénye ennél valamivel nagyobb, ezért a rehidráló folyadék mellé egyéb folyadék fogyasztása is ajánlott. A hányinger csökkentése és a bevétel könnyítése céljából a rehidráló folyadékot 10-15 °C-on célszerű elfogyasztani. Figyelmeztessük a beteget vagy hozzátartozóját, hogy a porkeveréket ivóvízben kell feloldani! Az orvos kérésére, illetve a beteg vagy hozzátartozójának kívánságára a porkeverék oldását a gyógyszerész is elvégezheti. A gyógyszerész, ill. a beteg vagy hozzátartozója által készített oldat 1 napig használható fel. (Mikrobiológiai szempontok miatt.)

Hatóanyagok

Natrii chloridum: *elektrolit.*

Kalii chloridum: *elektrolit.*

Natrii citras: *elektrolit.*

Ellenjavallat

Hyperchloraemia. Hyperkalaemia. Alkalosis. Diabetes mellitus.

Figyelmeztetés

Óvatosan adható vese-, mellékvese-, szívelégtelenség, acut dehydratio, kiterjedt szöveti destructio esetén. Ilyen esetben a klinikai status, szérum-elektrolitszint és EKG monitorozás szükséges. Digitalis és kálium-spóroló diureticum adása esetén a szérum káliumszint rendszeres ellenőrzése szükséges.

Kölcsönhatás

Szérum kálium szintjét növelő szerek: kálium spóroló diureticumok, ACE-gátlók, cyclosporin, kálium tartalmú gyógyszerek egyidejű adása esetén emelkedik a plasma kálium-szintje, hyperkalaemia alakulhat ki.

Mellékhatás

Hyperkalaemia, alkalosis, hasmenés, hányás, hányinger, gyomornyálkahártya irritáció előfordulhat.