147/2020/01

Sal ad rehydrationem pro parvulo
(Sal ad rehydr. pro parvul.)

Oralis rehydráló terápia.

ATC besorolás: elektrolit oldatok B05XA.

Javallat

Rehydratio, elektrolitvesztés gyermekeknél.

Rp.

Natrii chloridi

centigrammata nonaginta (g 0,9)

Kalii chloridi

gramma unum et centigrammata nonaginta (g 1,9)

Natrii citratis

grammata tria (g 3,0)

Glucosi anhydrici

grammata viginti quinque (g 25,0)

M. f. pulvis.

D.S.: [A pontos adagolást a vényen az orvosnak minden esetben fel kell tüntetnie.] **Száraz helyen tartandó! Elkészítés után 24 óráig használható fel. Gyermekgyógyszer.**

Rendeléskor készítendő.

Fontos tudnivalók

Csak vényre adható ki. 25 g glükózt tartalmaz. Az orvosnak a beteggel minden esetben be kell tartatnia az általa megadott adagolási utasítást. Orvosi utasítás hiányában tájékoztatóul a *szokásos adagolás: 1 liter vízben oldva.* Enyhe és közepesen súlyos esetben, legfeljebb 5% testtömegcsökkenés esetén 4 óra alatt 50 ml/ttkg folyadék bevitele szükséges. Súlyosabb esetekben, amikor a testtömegcsökkenés 5-9%, 6 óra alatt 100 ml/ttkg folyadékbevitel szükséges, de itt az iv. folyadékpótlás is szükségessé válhat. Súlyos, 10% feletti testtömegcsökkenéssel járó dehydratióban infúzió formájában történő folyadékpótlás szükséges. A fenntartó kezeléshez szükséges adagok meghatározásánál a természetes folyadékigényt is figyelembe kell venni, amely testtömegkilogrammonként, naponta

csecsemőkorban	150-160 ml
1-3 éves korban	120-130 ml
4-6 éves korban	90-110 ml
7-9 éves korban	70-90 ml

A rehidráló oldat és egyéb folyadék (anyatej, ivóvíz, csekély cukortartalmú gyümölcslevek) fogyasztásának aránya kezdetben 2:1, majd 1:1 legyen. A folyadék fogyasztási hőmérséklete 10-15 °C körül a legkedvezőbb, így könnyebb a bevétele és a hányinger is csökken. A rehidrálás-befejezése után a kiskorú beteg táplálásának megkezdését 24 órán túl nem szabad késleltetni! Figyelmeztessük a beteget vagy hozzátartozóját, hogy a porkeveréket ivóvízben kell feloldani. Az orvos kérésére, illetve a beteg vagy hozzátartozójának kívánságára a porkeverék oldását a gyógyszerész is elvégezheti. A

gyógyszerész, ill. a beteg vagy hozzátartozója által készített oldat 1 napig használható fel. (Mikrobiológiai szempontok miatt.)

Hatóanyagok

Natrii chloridum: *elektrolit.*

Kalii chloridum: *elektrolit.*

Natrii citras: *elektrolit.*

Ellenjavallat

Hyperchloraemia, hyperkalaemia, oliguria, anuria. Diabetes mellitus.

Figyelmeztetés

Óvatosan adható vese-, mellékvese-, szívelégtelenség, acut dehydratio, kiterjedt szöveti destructio esetén. Ilyen esetben a klinikai status, szérumelektrolitszint és EKG monitorozás szükséges. Digitalis és kálium-spóroló diureticum adása esetén a szérum káliumszint rendszeres ellenőrzése szükséges.

Kölcsönhatás

Szérum kálium szintet növelő szerek: kálium spóroló diureticumok, ACE-gátlók, cyclosporin, kálium tartalmú gyógyszerek egyidejű adása esetén emelkedik a plasma kálium-szintje, hyperkalaemia alakulhat ki.

Mellékhatás

Hyperkalaemia, alkalosis, hasmenés, hányás, hányinger, gyomornyálkahártya-irritáció előfordulhatnak.