150/2020/01

Sambuci flos
(Samb. fl.)

Javallat

Megfázás korai tüneteinek enyhítésére, belsőleg.

Összetétel

Hatóanyagok 20 ml adagban

2 g Fekete bodza virág: *izzasztószer, gyulladáscsökkentő, vizelethajtó és baktérium ellenes hatású.*

Egyéb összetevők: –.

Tárolás

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Különleges tárolást nem igényel.

Alkalmazással kapcsolatos fontos tudnivalók

2,0-5,0 g (kb. 20-50 ml) aprított fekete bodza virágot 1,5 dl forrásban lévő vízzel leöntünk, gyakori kevergetés közben 15 percig állni hagyjuk. Leszűrés után elfogyasztjuk. Naponta 3-szor alkalmazandó. A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Ellenjavallat

Az alábbi esetben Önnél nem alkalmazható a készítmény.

Fekete bodza virággal szembeni ismert túlérzékenység.

Figyelmeztetés

Az alábbi esetekben a készítmény alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Adatok hiányában terhes és szoptató nőknek, valamint 12 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ha a tünetek 1 hét alatt nem enyhülnek, vagy a kezelés ideje alatt súlyosbodnak (pl. nehézlégzés, indokolatlan láz, gennyes köpet lép fel), orvoshoz kell fordulni.

Lehetséges mellékhatás

Ha Önnél bármelyik, alább felsorolt vagy egyéb mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Allergiás reakciók, nem ismert gyakorisággal.

Allergiás tünet észlelése esetén hagyja abba a gyógyszer alkalmazását. Amennyiben Ön súlyos allergiás tüneteket, vagy egyéb súlyos mellékhatást észlel, hagyja abba a gyógyszer alkalmazását, és azonnal kérjen orvosi segítséget.