**154/2020/01**

# Sirupus laxans
(Sir. lax.)

*Laxativum.*

ATC besorolás: székrekedés elleni szerek – kontakt hashajtók – szenna-glikozidok, kombinációk A06AB56.

**Javallat**

Obstipatio.

**Rp.**

**Sirupi laxantis FoNo VIII.**

grammata viginti (g 20,0)

**D.S.: Hashajtó.**

**Fontos tudnivalók**

20 g készítmény 10 g szacharózt tartalmaz. *Szokásos adagolása felnőtteknek:* szükség esetén 7-20 g-ot (kb. 5-16 ml) este bevenni. *12 év feletti gyermekeknek és serdülőknek* szükség esetén 7 g-t (kb. 5 ml), naponta legfeljebb kétszer. A készítmény 2-3 naponként, legfeljebb 1 hétig szedhető. Figyelmeztessük a beteget, hogy a gyógyszer a lúgos kémhatású vizeletet pirosra festheti.

**Hatóanyagok**

**Sennae foliolum:** *a belekben keletkező kénhidrogén fokozza a bélperisztaltikát.*

**Foeniculi dulcis fructus:** *spasmolyticum, secretolyticum, enyhe antibakteriális hatású (illóolaj).*

**Natrii sulfas anhydricus:** *vízben könnyen oldódik, a bélből igen kevéssé szívódik fel, vizet tart vissza a bél lumenében, és ezzel elősegíti a béltartalom kiürülését.*

**Ellenjavallat**

Bélelzáródás, a belek gyulladásos betegsége, ismeretlen eredetű hasi fájdalom, víz- és elektrolitvesztés miatti dehydratio, terhesség, szoptatás. 12 éves kor alatti életkor.

**Figyelmeztetés**

Az anyatejbe átjutó hatóanyag (extract. sennae folium) a szoptatott csecsemőben kólikás fájdalmat, hasmenést, exsiccosist okozhat. Senna extractumok tartós alkalmazása kerülendő, mert állatkísérletben tapasztalt bélcsatornát károsító hatásai emberre is veszélyt jelenthetnek. A szennozid napi adagja nem haladhatja meg a 30 mg-ot, amely kb. 24 g készítménynek felel meg. Egy hétnél hosszabb ideig nem alkalmazható.

**Kölcsönhatás**

Tartós alkalmazás esetén káliumvesztés miatt növeli a szívglikozidok toxikus hatását, és befolyásolja az antiarrhythmiás szerek hatását. Diuretikumok, kortikoszteroidok és az édesgyökér alkalmazása növeli a szennalevél által fokozott káliumvesztést.

**Mellékhatás**

Allergiás reakciók, bőrkiütés, dermatitis. Hasi fájdalom, görcsös gyomor-bél panaszok, elektrolitveszteség (főleg kálium), ritkán májkárosodás, fehérjevizelés, vérvizelés jelentkezhet.