159/2020/01

Solutio ad nephrolithum

(Sol. ad nephrolith.)

Javallat

Urát vesekövek oldására.

Összetétel

Hatóanyagok 1 ml oldatban:

0,08 g Citromsav: s*ói a kálium és nátrium-citrát sók a szervezetben kálium és nátrium-hidrogénkarbonát formájában fejtik ki lúgosító hatásukat.*

0,12 g Nátrium-citrát: *lúgosító hatású.*

0,12 g Trikálium-citrát: *lúgosító hatású.*

Egyéb összetevők: metil-parahidroxibenzoát, 96%-os etanol, szorbinsav és szacharóz vagy szorbit, tisztított víz.

Tárolás

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Különleges tárolást nem igényel.

Alkalmazással kapcsolatos fontos tudnivalók

Csak vényre kapható. Az orvos által megadott használati utasítást minden esetben be kell tartani. Ha az orvos másképp nem rendeli szokásos adagja: naponta 3x15 ml-t étkezés után bevenni. 15 ml készítmény 4,2 g szorbitot vagy 3,78 g szacharózt tartalmaz. Alkalmazása rendszeres orvosi ellenőrzés mellett történhet.

Ellenjavallat

Az alábbi esetekben Önnél nem alkalmazható a készítmény.

A vér kálium tartalmának kórosan magas szintje, veseelégtelenség, csökkent vizelet elválasztás, vagy annak megszűnése, húgyvérűség, kiszáradás, gyomorfekély.

Figyelmeztetés

Az alábbi esetekben a készítmény alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Digitalis és kálium-spóroló diureticum adása esetén a szérum káliumszintjének rendszeres ellenőrzése szükséges.

Kölcsönhatás

Tájékoztassa kezelőorvosát, gyógyszerészét, ha az alábbiakban említett gyógyszerek közül bármelyiket is alkalmazza.

ACE-gátlók, kálium-spóroló vizelethajtók, cyclosporin egyidejű adása esetén kórosan megemelkedhet a vér kálium szintje.

Tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben alkalmazott, valamint alkalmazni tervezett egyéb gyógyszereiről is.

Lehetséges mellékhatás

Ha Önnél bármelyik, alább felsorolt vagy egyéb mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Hasmenés, hányás, hányinger.

Allergiás tünet észlelése esetén hagyja abba a gyógyszer alkalmazását. Amennyiben Ön súlyos allergiás tüneteket, vagy egyéb súlyos mellékhatást észlel, hagyja abba a gyógyszer alkalmazását, és azonnal kérjen orvosi segítséget.