159/2020/01

Solutio ad nephrolithum

(Sol. ad nephrolith.)

Nephrolyticum.

ATC besorolás: urológiai készítmények − húgyúti kőoldók G04BC.

Javallat

Urát vesekövek oldására.

Rp.

Acidi citrici monohydrici

grammata quadraginta (g 40,0)

Natrii citratis

Kalii citratis

aa grammata sexaginta (aa g 60,0)

Solutionis conservantis FoNo VIII.

grammata septem et semis (g 7,5)

Sirupi sorbitoli FoNo VIII.

vel

Sirupi simplicis FoNo VIII.

grammata ducenta (g 200,0)

Aquae purificatae

ad grammata quingenti (ad g 500,0)

M. f. solutio.

S.: [A pontos adagolást a vényen az orvosnak minden esetben fel kell tüntetnie.]

Fontos tudnivalók

Csak vényre adható ki. *Szokásos adagolás: naponta 3x15 ml-t étkezés után bevenni.* 15 ml készítmény 4,2 g szorbitot vagy 3,78 g szacharózt tartalmaz. Alkalmazása rendszeres orvosi ellenőrzés mellett történhet.

Hatóanyagok

Acidum citricum monohydricum: s*ói a kálium és nátrium-citrát sók kálium és nátrium-hidrogénkarbonáttá metabolizálódnak, így fejtik ki szisztémás lúgosító hatásukat.*

Natrii citras: *lúgosító hatású.*

Kalii citras: *lúgosító hatású.*

Ellenjavallat

Hyperkalaemia, veseelégtelenség, oliguria, azotaemia, anuria, dehydratio, ulcus pepticum.

Figyelmeztetés

Digitalis és kálium-spóroló diureticum adása esetén a szérum káliumszint rendszeres ellenőrzése szükséges.

Kölcsönhatás

ACE-gátlók, kálium-spóroló diureticumok, cyclosporin egyidejű adása esetén hyperkalaemia alakulhat ki.

Mellékhatás

Hasmenés, hányás, hányinger.