162/2020/01

Solutio chlorhexidini 0,2%

(Sol. chlohexidin. 0,2%)

Antisepticum

ATC besorolás: gégészeti gyógyszerkészítmények − antiszeptikumok − klórhexidin R02AA05.

Javallat

A szájnyálkahártya bakteriális eredetű gyulladásos folyamatai.

Rp.

Chlorhexidini digluconatis solutionis

gramma unum (g 1,0)

Diluendi menthae FoNo VIII.

grammata quinque (g 5,0)

Aquae purificatae

ad grammata centum (ad g 100,0)

M. f. solutio.

D.: ad vitrum fuscum

S.: Külsőleg. Szájüreg ecsetelésére.

Fontos tudnivalók

Külsőleges alkalmazásra. Szájüreg ecsetelésére. Szükség szerint a szájüreget a készítménnyel naponta 1-3-szor kell ecsetelni.

Hatóanyagok

Chlorhexidini digluconatis solutio: *széles spektrumú antisepticum, Gram-pozitív, Gram-negatív és fakultatív aerob, anaerob baktériumokra, valamint egyes gombákra hat. Alkalmazható gingivitis, periodontitis, a torok és szájnyálkahártya felületes bakteriális fertőzéseinek kezelésére*.

Ellenjavallat

A készítmény összetevőivel szembeni ismert túlérzékenység. A készítmény újszülötteknél, csecsemőknél, 2 év alatti gyermekeknél nem alkalmazható, mivel belélegezve dyspnoét okozhat. Kettő és négy év közötti gyermekeknél kellő klinikai tapasztalat hiányában alkalmazása nem ajánlott.

Figyelmeztetés

Lenyelni nem szabad. Szembe kerülve cornea károsodást okozhat.

Kölcsönhatás

Egyes fogkrémekkel inkompatibilis (fél óra teljen el a kezelés és a fogmosás között).

Mellékhatás

Tartós alkalmazás során a fogak és a nyálkahártya elszíneződése, ízérzés zavara, a bőrrel érintkezve irritáció lehetséges.