165/2020/01

✠

Solutio gingivalis

(Sol. gingiv.)

Odonthologicum. Antiphlogisticum. Anaestheticum.

ATC besorolás: fogászati készítmények − egyéb készítmények helyi szájkezeléshez A01AD11.

Javallat

A szájnyálkahártya és a gingiva gyulladásos folyamatai.

Rp.

Levomentholi

centigrammata quinque (g 0,05)

Lidocaini

centigrammata decem (g 0,10)

Tincturae chamomillae

grammata quinque (g 5,0)

Glyceroli 85%

grammata viginti quinque (g 25,0)

M. f. solutio.

D.S.: Külsőleg. Fogíny vagy szájnyálkahártya ecsetelésére. [A pontos adagolást a vényen az orvosnak minden esetben fel kell tüntetnie.]

Fontos tudnivalók

Csak vényre adható ki. Erős hatású szert tartalmaz. *Szokásos alkalmazás: naponta legfeljebb 3-szor, étkezés után a gyulladt fogíny illetve szájnyálkahártya ecsetelése, néhány csepp készítménnyel megnedvesített vattával vagy gézlappal.*

Hatóanyagok

Levomentholum: *fájdalom és égető érzés enyhítésére.*

Lidocainum: *savamid típusú local anaestheticum nyálkahártya érzéstelenítésre.*

Tinctura chamomillae: *enyhe antiphlogisticum, antiszeptikus hatású.*

Ellenjavallat

Kamillavirággal, lidokainnal és mentollal szembeni ismert túlérzékenység. A készítmény újszülötteknél, csecsemőknél, 2 év alatti gyermekeknél nem alkalmazható, mivel belélegezve dyspnoét okozhat. Kettő és négy év közötti gyermekeknél kellő klinikai tapasztalat hiányában alkalmazása nem ajánlott.

Figyelmeztetés

A lidokain az anyatejbe kiválasztódik, ezért szoptatás esetén fokozott óvatosság szükséges. A lidokain jól felszívódik a nyálkahártyáról. Óvatosan alkalmazandó epilepsziás betegnél, továbbá bradycardia esetén és amennyiben májfunkciós zavar áll fenn. Nyelési zavart, ezáltal aspiráció veszélyét okozhatja, különösen gyermekeknél. A nyelv és a buccalis nyálkahártya zsibbadása miatt nagyobb a valószínűsége a harapásos sérüléseknek. Ügyelni kell rá, hogy a készítmény ne kerüljön a szembe, mert irritációt okozhat. Ha a készítmény a szembe került, a szemet azonnal vízzel öblíteni és védeni kell, míg az érzékelés vissza nem tér.

Kölcsönhatás

A készítmény hatóanyag, a lidokain óvatosan alkalmazandó olyan betegeknél, akik 1B vagy 3 csoportba tartozó antiarrhythmiás készítményeket szednek, mint például tokainid, mexiletin ill. amiodaron, mert a toxikus hatások összeadódhatnak.

Mellékhatás

Túlérzékenységi reakciót válthat ki. Igen ritkán anaphylaxiát okozhat (helyi oedema képződés, nehézlégzés), de nem ad keresztallergiát az észter típusú helyi érzéstelenítőkkel (pl. prokain). Allergiás reakciók (conjunctivitis, szemhéjoedema, contact dermatitis és ekzema). A mellékhatások elsősorban azoknál a betegeknél jelentkeztek, akiknek a kórtörténetében asthma és allergiás rhinitis fordult elő. Rendkívül ritkák a központi idegrendszeri (szédülés, álmosság, görcsök, izgatottság és/vagy depressio, légzésbénulás), illetve a cardiovascularis (hypotonia, myocardialis depressio, bradycardia, szívmegállás) mellékhatások.