173/2020/01

Solutio pro colonoscopia
(Sol. pro colonosc.)

Javallat

Colonoscopia előtti vastagbél előkészítés.

Összetétel

Hatóanyagok 1 ml oldatban

0,75 mg Kálium-klorid: *elektrolit.*

1,45 mg Nátrium-klorid: *elektrolit.*

1,7 mg Nátrium-hidrogén-karbonát: *savkötő, a bélnyálkahártyát enyhén izgatja, így elősegíti a béltartalom kiürülését.*

5,7 mg Vízmentes nátrium-szulfát: *vízben jól oldódik, a bélből igen kevéssé szívódik fel, vizet tart vissza a bél lumenében, és ezzel elősegíti a béltartalom kiürülését.*

0,06 g Makrogol 4000: *hashajtó hatású.*

Egyéb összetevők: tisztított víz.

Tárolás

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Hűvös helyen tartandó.

Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.

Alkalmazással kapcsolatos fontos tudnivalók

Kolonoszkópos előkészítő oldat. Felnőtt gyógyszer. Felnőtteknek 12-24 órával a kolonoszkópia (vastagbél tükrözés) előtt több részletben kell meginni.

Ellenjavallat

Az alábbi esetekben Önnél nem alkalmazható a készítmény.

A készítmény összetevőivel szembeni ismert túlérzékenység. Szív eredetű keringési zavar (dekompenzáció), kóros veseműködés, a vér magas kálium koncentrációja, a só és víz-háztartás zavara.

Figyelmeztetés

Az alábbi esetekben a készítmény alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Szívglikozidokat (digoxin, digitoxin) tartalmazó készítmények alkalmazása esetén csak a kockázat-haszon arányának gondos mérlegelése után alkalmazható.

Kölcsönhatás

Tájékoztassa kezelőorvosát, gyógyszerészét, ha az alábbiakban említett gyógyszerek közül bármelyiket is alkalmazza.

Szívglikozidok (digoxin, digitoxin): a kálium vérszintjét növelő (pl. káliumsók) készítmények csökkentik a digitoxin szív erejét fokozó hatását és növelik a szívritmuszavarok gyakoriságát.

Tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben alkalmazott, valamint alkalmazni tervezett egyéb gyógyszereiről is.

Lehetséges mellékhatás

Ha Önnél bármelyik, alább felsorolt vagy egyéb mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Hányinger, gyomor-bélrendszeri panaszok.

Allergiás tünet észlelése esetén hagyja abba a gyógyszer alkalmazását. Amennyiben súlyos allergiás tüneteket, vagy egyéb súlyos mellékhatást észlel, hagyja abba a gyógyszer alkalmazását, és azonnal kérjen orvosi segítséget.