173/2020/01

Solutio pro colonoscopia
(Sol. pro colonosc.)

I.	**Kalii chloridum**	**1,5 g**
I.	**Natrii chloridum**	**2,9 g**
I.	**Natrii hydrogenocarbonas**	**3,4 g**
I.	**Natrii sulfas anhydricus**	**11,4 g**
I.	**Macrogola 4000**	**118,0 g**
II.	**Aqua purificata**	**ad 2000,0 g**

Készítés

Az I. alatti alkotórészeket tömegük szerint növekvő sorrendben oldjuk a II-ban.

Expedíció

Sötét üvegben.

Szignatúra

Colonoscopos előkészítő oldat. Csak felnőtteknek. Hűvös helyen tartandó.

Eltartás gyógyszertárban

Hűvös helyen vagy hűtőszekrényben tartandó.

Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.

Purgatívum.

ATC besorolás: ozmotikusan ható hashajtók – macrogol A06AD15.

Fontos tudnivalók

Felnőtteknek 12-24 órával a beavatkozás előtt több részletben kell meginni.

Hatóanyagok

Kalii chloridum: *elektrolit.*

Natrii chloridum: *elektrolit.*

Natrii hydrogenocarbonas: *savkötő, a bélnyálkahártyát enyhén izgatja, így elősegíti a béltartalom kiürülését.*

Natrii sulfas anhydricus: *vízben jól oldódik, a bélből igen kevéssé szívódik fel, vizet tart vissza a bél lumenében, és ezzel elősegíti a béltartalom kiürülését.*

Macrogola 4000: *hashajtó hatású.*

Javallat

Colonoscopia előtti vastagbél előkészítés.

Ellenjavallat

A készítmény összetevőivel szembeni ismert túlérzékenység. Cardiális decompenzáció, kóros veseműködés, hyperkalémia, a só és víz-háztartás zavara.

Figyelmeztetés

Szívglikozidokat (digoxin, digitoxin) tartalmazó készítmények alkalmazása esetén csak a kockázat haszon arányának gondos mérlegelése után alkalmazható.

Kölcsönhatás

Szívglikozidok (digoxin, digitoxin): a kálium vérszintjét növelő készítmények (pl. káliumsók) csökkentik a digitoxin pozitív inotrop hatását és növelik az arrhythmiák gyakoriságát.

Mellékhatás

Hányinger, gastrointestinalis panaszok.