173/2020/01

Solutio pro colonoscopia
(Sol. pro colonosc.)

Purgatívum.

ATC besorolás: ozmotikusan ható hashajtók – macrogol A06AD15.

Javallat

Colonoscopia előtti vastagbél előkészítés.

Rp.

Kalii chloridi

gramma unum et semis (g 1,5)

Natrii chloridi

grammata duo et centigrammata nonaginta (g 2,9)

Natrii hydrogenocarbonatis

grammata tria et centigrammata quadraginta (g 3,4)

Natrii sulfatis anhydrici

grammata undecim et centigrammata quadraginta (g 11,4)

Macrogoli 4000

grammata centum duodeviginti (g 118,0)

Aquae purificatae

ad grammata duo milia (ad g 2000,0)

M. f. solutio.
D. ad vitrum fuscum.
S.: Colonoscopos előkészítő oldat. Csak felnőtteknek! Hűvös helyen tartandó!
Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.

Fontos tudnivalók

Felnőtteknek 12-24 órával a beavatkozás előtt több részletben kell meginni.

Hatóanyagok

Kalii chloridum: *elektrolit.*

Natrii chloridum: *elektrolit.*

Natrii hydrogenocarbonas: *savkötő, a bélnyálkahártyát enyhén izgatja, így elősegíti a béltartalom kiürülését.*

Natrii sulfas anhydricus: *vízben jól oldódik, a bélből igen kevéssé szívódik fel, vizet tart vissza a bél lumenében, és ezzel elősegíti a béltartalom kiürülését.*

Macrogola 4000: *hashajtó hatású.*

Ellenjavallat

A készítmény összetevőivel szembeni ismert túlérzékenység. Cardiális decompenzáció, kóros veseműködés, hyperkalémia, a só és víz-háztartás zavara.

Figyelmeztetés

Szívglikozidokat (digoxin, digitoxin) tartalmazó készítmények alkalmazása esetén csak a kockázat haszon arányának gondos mérlegelése után alkalmazható.

Kölcsönhatás

Szívglikozidok (digoxin, digitoxin): a kálium vérszintjét növelő készítmények (pl. káliumsók) csökkentik a digitoxin pozitív inotrop hatását és növelik az arrhythmiák gyakoriságát.

Mellékhatás

Hányinger, gastrointestinalis panaszok.