230/2025/02

Suspensio expectorans
(Susp. expect.)

Javallat

Száraz hörgőgyulladás kezelésére alkalmazható készítmény.

Összetétel

Hatóanyagok 1 ml szuszpenzióban

8 mg Terpin monohidrát: *a hörgők nyákelválasztását fokozó köptető.*

0,032 g Szirupkészítéshez való narancs-tinktúra: *keserű anyagai fokozzák a nyálszekréciót, étvágyjavító.*

0,16 g Kakukkfű-tinktúra: *köptető, köhögéscsillapító, szélhajtó, fertőtlenítő, étvágyjavító.*

Egyéb összetevők: fűszeres tinktúra, (mely tartalmaz kassziai fahéjat, narancshéjat, kardamomumtermést, szegfűszeget), 96%-os etanol, szorbinsav, szacharóz, tisztított víz, metil-parahidroxibenzoát, hidroxietilcellulóz.

Tárolás

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Hűtőszekrényben tartandó.

Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.

Alkalmazással kapcsolatos fontos tudnivalók

Bevétele étkezés után javasolt. Használat előtt felrázandó. A készítmény felbontás után 14 napig használható. A készítmény egy adagja (15 ml) kb. 3,2 g szacharózt tartalmaz. Szokásos adagolása felnőtteknek és 15 év feletti serdülőknek: naponta 3-4-szer 15 ml, 9-15 éves gyermekeknek: naponta 3-szor 12 ml, 6-9 éves gyermekeknek: naponta 3-szor 9 ml.

Ellenjavallat

Az alábbi esetekben Önnél nem alkalmazható a készítmény.

A készítmény összetevőivel szembeni túlérzékenység, az árvacsalánfélék (Lamiaceae) családjába tartozó növényekkel szemben fennálló túlérzékenység. Tüdőasztma.

Figyelmeztetés

Az alábbi esetekben a készítmény alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

A készítmény 1 adagja (15 ml) kb. 3,2 g szacharózt tartalmaz. A készítmény alkalmazása 6 év alatti életkorban, terhesség és szoptatás időszakában nem javasolt. Ritkán előforduló, örökletes fruktóz összeférhetetlenség esetén, glükóz-galaktóz felszívódási zavarban szenvedők számára, vagy szacharáz-izomaltáz hiányban a készítmény nem alkalmazható. A készítmény egy adagja (15 ml) 0.9 g etanolt (alkohol) tartalmaz. Súlyos májbetegség vagy epilepszia esetén a készítmény szedése nem javasolt. Orvosi konzultáció szükséges abban az esetben, ha az alkalmazás ideje alatt a tünetek továbbra is fennmaradnak, esetleg rosszabbodnak.

Lehetséges mellékhatás

Ha Önnél bármelyik, alább felsorolt vagy egyéb mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Előfordulhatnak túlérzékenységi reakciók, pl. nehézlégzés, bőrkiütés, csalánkiütés, arc-, száj- és torok vizenyő (Quincke-ödéma), allergiás eredetű túlérzékenységi reakció (sokk), gyomor-bél tünetek (pl. hasi fájdalom, görcsök, hányinger, hányás).

Allergiás tünet észlelése esetén hagyja abba a gyógyszer alkalmazását. Amennyiben súlyos allergiás tüneteket, vagy egyéb súlyos mellékhatást észlel, hagyja abba a gyógyszer alkalmazását, és azonnal kérjen orvosi segítséget.