233/2020/01

✠

Suspensio nystatini

(Susp. nystatin.)

Antimycoticum.

ATC besorolás: gombásodás elleni lokális készítmények −antibiotikumok − nisztatin D01AA01.

Javallat

A száj-garat gombás fertőzései (Candidiasis). Csecsemőkori soor.

Rp.

Nystatini

gramma unum et semis (g 1,5)

Sirupi sorbitoli FoNo VIII.

vel

Sirupi simplicis FoNo VIII.

grammata viginti (g 20,0)

Mucilaginis hydroxyaethylcellulosi FoNo VIII.

grammata quindecim (g 15,0)

Solutionis conservantis FoNo VIII.

gramma semis (g 0,50)

Aquae purificatae

ad grammata quinquaginta (ad g 50,0)

M. f. solutio.

D.S.: Külsőleg. Szájecsetelésre. [A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden esetben fel kell tüntetnie.] **Használat előtt felrázandó! Felbontástól számítva 14 napig használható. Hűtőszekrényben tartandó!**

Rendeléskor készítendő.

Fontos tudnivalók

Csak vényre adható ki. Erős hatású szert tartalmaz. 28 g szorbitot, vagy 25 g szacharózt tartalmaz. *Szokásos alkalmazás: a szájüreget minden étkezés illetve szopás után, de legalább naponta négyszer kell a készítménnyel átitatott gézlappal kitörölni.* A csecsemők újrafertőződésének megelőzésére fontos az eszközök (pl. cumi, cumisüveg) sterilezése és szükség esetén az anyai mell kezelése is.

Hatóanyagok

Nystatinum: *fungistaticus és fungicid hatású polien antimycoticum. Elsősorban a candida speciesek ellen hatásos. Ezenkívül a következő gombákra is hat: Blastomyces dermatitis, brasiliensis, coccidiodes immitis, cryptococcus neoformans, histoplasma capsulatum, epidermophyton speciesek. A gyomor-bél traktusból nem, a bőr felületéről csak minimális mértékben szívódik fel.*

Ellenjavallat

A készítmény hatóanyagaival vagy egyéb összetevőjével szembeni ismert túlérzékenység. Hámfosztott nyálkahártyán nem alkalmazható.

Figyelmeztetés

Gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Alkalmazása a terhesség első trimeszterében nem javasolt.

Mellékhatás

Ritkán helyi irritáció, túlérzékenységi reakciók jelentkezhetnek.