242/2020/01

Tinctura adstringens
(Tinct. adstr.)

Javallatok

Fogínygyulladás, szájnyálkahártya-gyulladás, a fog melletti ínytasak gennyes gyulladása.

Összetétel

Hatóanyagok 1 ml készítményben

- **16 mg Jód:** *fertőtlenítő, gombaellenes*
- **0,33 g Ratanhia-tinktúra:** *összehúzó hatású.*
- **0,33 g Kamilla-tinktúra:** *gyulladáscsökkentő, enyhe baktérium-ellenes hatású.*

Egyéb összetevők: kálium-jodid, alkohol, tisztított víz.

Tárolás

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Különleges tárolást nem igényel.

Felhasználhatósági időtartam 3 hónap.

Alkalmazással kapcsolatos fontos tudnivalók

A fogíny ecsetelése a hígítatlan oldat néhány cseppjével naponta egyszer végezhető. A készítmény elkészíthető alkoholos-jód-oldat nélkül, Tinctura adstringens sine iodo néven. Ebben az esetben a készítmény 7,5 g Kamilla-tinktúrát és 7,5 g Ratanhia-tinktúrát tartalmaz. Szájöblítésre alkalmazható. 20 cseppet ½ pohár langyos vízbe cseppentünk. Ezzel naponta 3-4-szer lehet öblögetni. Gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Ellenjavallat

Az alábbi esetekben Önnél nem alkalmazható a készítmény.

Jóddal és a készítmény más összetevőivel, valamint kamillavirággal szembeni ismert túlérzékenység. Pajzsmirigy betegség, 18 év alatti életkor, Terhesség, szoptatás időszaka.

Figyelmeztetés

Az alábbi esetekben a készítmény alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Ha a tünetek 2 hétnél hosszabb időn át fennállnak, vagy a kezelés ideje alatt súlyosbodnak, orvoshoz kell fordulni.

Lehetséges mellékhatás

Ha Önnél bármelyik, alább felsorolt vagy egyéb mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Túlérzékenységi reakciók, mint bőrpír, bőrgyulladás. Igen ritkán a nyálkahártya allergiás reakciója. Allergiás reakciók (kötőhártya-gyulladás, szemhéj ödéma, kontakt bőrgyulladás és ekcéma). A mellékhatások elsősorban azoknál a betegeknél jelentkeztek, akiknek kórtörténetében asztma és allergiás orrnyálkahártya-gyulladás fordult elő.

Allergiás tünet észlelése esetén hagyja abba a gyógyszer alkalmazását. Amennyiben Ön súlyos allergiás tüneteket, vagy egyéb súlyos mellékhatást észlel, hagyja abba a gyógyszer alkalmazását, és azonnal kérjen orvosi segítséget.