242/2020/01

Tinctura adstringens
(Tinct. adstr.)

Solutio iodi alcoholica FoNo VIII.	**5,0 g**
Ratanhiae tinctura	**5,0 g**
Tinctura chamomillae	**5,0 g**

Expedíció

Sötét üvegben, cseppentő feltéttel vagy cseppentő pipettával.

Szignatúra

Külsőleg. Fogíny ecsetelésére.

Felhasználhatósági időtartam 3 hónap.

Adstringens. Antisepticum.

ATC besorolás: fogászati készítmények A01A.

Fontos tudnivalók

A fogíny ecsetelése a hígítatlan oldat néhány cseppjével naponta egyszer végezhető. A készítmény elkészíthető Solutio iodi alcoholica nélkül, Tinctura adstringens sine iodo néven. Ebben az esetben a készítmény 7,5 g Kamilla-tinktúrát és 7,5 g Ratanhia-tinktúrát tartalmaz. Szájöblítésre alkalmazható, 20 cseppet ½ pohár langyos vízhez utasítással rendelve. Ezzel naponta 3-4-szer öblítsen a beteg. Gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Hatóanyagok

Iodum (Solutio iodi alcoholica hatóanyaga)**:** *antisepticum, antimycoticum.*

Ratanhiae tinctura: *adstringens (tannin).*

Tinctura chamomillae: *antiphlogisticum (kamazulén, α-bisabolol), enyhe antibacterialis hatású (cumarinok).*

Javallat

Gingivitis, stomatitis, pyorrhoe alveolaris.

Ellenjavallat

Jóddal és a készítmény más összetevőivel, valamint kamillavirággal szembeni ismert túlérzékenység. Pajzsmirigy betegség, 18 év alatti életkor, Terhesség, szoptatás időszaka.

Figyelmeztetés

Ha a tünetek 2 hétnél hosszabb időn át fennállnak, vagy a kezelés ideje alatt súlyosbodnak, orvoshoz kell fordulni.

Mellékhatás

Túlérzékenységi reakciók, mint erythema, dermatitis. Igen ritkán a nyálkahártya allergiás reakciója. Allergiás reakciók (conjunctivitis, szemhéjoedema, contact dermatitis és ekzema). A mellékhatások elsősorban azoknál a betegeknél jelentkeztek, akiknek kórtörténetében asthma és allergiás rhinitis fordult elő.