243/2020/01

Tinctura amara
(Tinct. amar.)

Javallat

Étvágyjavító.

Összetétel

Hatóanyagok 1 g termékben

0,06 g Vidrafűlevél: *az emésztést javító, keserűanyag.*

0,06 g Kis ezerjófű virágos hajtás: *a gyomornedv képződését fokozó, keserűanyag, emésztést javító, erősítő, tonikum.*

0,06 g Fehér üröm leveles vagy virágos hajtás: *keserűanyag, emésztést javító, fokozza az epe elválasztását, szélhajtó.*

0,02 g Narancstermésfal: *emésztést javító, enyhe görcsoldó, ízjavító.*

Egyéb összetevők: hígított alkohol.

Tárolás

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Különleges tárolást nem igényel.

Felhasználhatósági időtartam: 3 hónap.

Alkalmazással kapcsolatos fontos tudnivalók

Étkezés előtt 30 perccel 30 cseppet kevés vízzel bevenni. A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Ellenjavallat

Az alábbi esetekben Önnél nem alkalmazható a készítmény.

A készítmény összetevőivel szembeni ismert túlérzékenység. Gyomor- és nyombélfekély. Savtúltengés. Epevezeték-elzáródás, epeutak gyulladása, májbetegségek.

Figyelmeztetés

Az alábbi esetekben a készítmény alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Adatok hiányában 18 éves kor alatti serdülőknek és gyermekeknek, valamint terhes és szoptató nőknek nem ajánlott. Ha a tünetek 2 hétnél hosszabb időn át fennállnak, vagy a kezelés ideje alatt súlyosbodnak, orvoshoz kell fordulni. Epekövesség vagy egyéb epebetegség esetén a készítmény alkalmazhatóságát a kezelőorvossal meg kell beszélni. A készítmény 34-39 V/V% alkoholt tartalmaz. Az egyszeri adag kevesebb, mint 10 ml (kb. egy pohár 1/20-ad része) sörnek megfelelő alkoholt tartalmaz. Azonban a kis mennyiség ellenére az autóvezetést, a gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásolhatja. Ha a készítmény használatakor ilyet észlel, ne vezessen autót és ne kezeljen gépeket.

Kölcsönhatás

Tájékoztassa kezelőorvosát, gyógyszerészét, ha az alábbiakban említett gyógyszerek közül bármelyiket is alkalmazza.

A GABA-receptorokon ható gyógyszerek, például barbiturátok, benzodiazepinek, hatását befolyásolhatja, ezekkel való együttes szedése kerülendő.

Tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben alkalmazott, valamint alkalmazni tervezett egyéb gyógyszereiről is.

Lehetséges mellékhatás

Ha Önnél bármelyik, alább felsorolt vagy egyéb mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A terápiásnál nagyobb adagban a gyomornyálkahártyát irritálhatja.

Allergiás tünet észlelése esetén hagyja abba a gyógyszer alkalmazását. Amennyiben súlyos allergiás tüneteket, vagy egyéb súlyos mellékhatást észlel, hagyja abba a gyógyszer alkalmazását, és azonnal kérjen orvosi segítséget.