287/2020/01

Urticae radix
(Urticae rad.)

Javallat

A jóindulatú prosztata túltengés által a húgyúti traktus alsó részében okozott tünetek enyhítése, ha a súlyos kóroki tényezőket az orvos kizárta.

Összetétel

Hatóanyagok 12 ml adagban

1,5 g Csalángyökér: *enyhíti a jóindulatú prosztata túltengés tüneteit, vizelethajtó.*

Egyéb összetevők: –.

Tárolás

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Különleges tárolást nem igényel.

Alkalmazással kapcsolatos fontos tudnivalók

1,5 g (kb. 12 ml) aprított csalángyökeret 1,5 dl forró vízzel leöntünk, gyakori kevergetés közben ¼ óráig állni hagyjuk. Leszűrés után fogyasztjuk. Naponta 3-4-szer. 8 ml aprított csalángyökér mintegy 1 g-nak felel meg. A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Ellenjavallat

Az alábbi esetekben Önnél nem alkalmazható a készítmény.

Csalángyökérrel szembeni ismert túlérzékenység. Vesepanaszok.

Figyelmeztetés

Hosszú távú alkalmazása is lehetséges, de ha a tünetek a kezelés alatt nem javulnak, vagy súlyosbodnak, például láz, görcsök, véres vizelet, fájdalmas vizelés vagy vizelet-visszatartás jelentkezik, orvoshoz kell fordulni.

Lehetséges mellékhatás

Ha Önnél bármelyik, alább felsorolt vagy egyéb mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelő orvosát vagy gyógyszerészét.

Gyomor-bélrendszeri panaszok, mint hányinger, gyomorégés, teltségérzés, gyomor- és bélgáz képződés, hasmenés jelentkezhet, nem ismert gyakorisággal.

Allergiás tünet észlelése esetén hagyja abba a gyógyszer alkalmazását. Amennyiben súlyos allergiás tüneteket, vagy egyéb súlyos mellékhatást észlel, hagyja abba a gyógyszer alkalmazását, és azonnal kérjen orvosi segítséget.